

## VIVACES

Ensayos realizados en el  
Vivero Municipal de Estufas del Retiro,  
situado en el centro de Madrid

## ***Abutilon x hybridum***

Familia: *Malvaceae*

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Arbusto caducifolio. Utilizado frecuentemente en el mediterráneo. Aguanta las heladas débiles.
- Altura: 50-100 cm. Es necesario podarlo para limitar la altura.
- Zonas 8-10.
- Hojas verdes, palmeadas.
- Flores amarillas, acampanadas, tienden a colgar.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



julio-2019

## ***Abutilon megapotamicum* (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin**

Familia: *Malvaceae*

**Origen:** Brasil.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Arbusto caducifolio. Aguanta heladas débiles.
- Porte semicolgante. Altura: 100 cm.
- Zonas 8-10.
- Flores colgantes, con cáliz tubular rojizo y corola tubular amarilla.
- Hojas oval-lanceoladas.
- Es necesario podarlo para limitar su espacio.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



julio-2019

## *Acaena inermis* Hook.f.

Familia: *Rosaceae*

**Origen:** Nueva Zelanda.

**Plantación:** otoño-2008.

**Cultivo:** semilla.

### Características:

- Vivaz, perennifolia.
- Mata rastrera, colgante.  
Altura: 10 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas pequeñas, compuestas, verde glauco con tonos bronce (tapiz de cobre).
- Flores en cabezuelas, que dan lugar a frutos esféricos, de color verde rosa.
- Debe plantarse en zonas de media sombra.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



5-mayo-2009



11-junio-2009



10-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Acanthus mollis* L.**

Familia: *Acanthaceae*

**Cultivo:** semilla. División de mata. Crecimiento lento.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea desaparece en pleno verano, después de la floración. A finales del verano brota de nuevo.
- Mata con hojas basales. Altura: 1,5 m. con inflorescencias.
- Zonas climáticas: 7-9.
- Hojas de gran tamaño, de bordes recortados.
- Floración de corta duración. a finales de primavera

**Plagas y enfermedades:** oídio.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-alto.



5-mayo-2019



25-junio-2019

## *Achillea millefolium* L.

Variedad: "Summer fruits"

Familia: Compositae

**Origen:** Europa. Muchas variedades.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 5-Mayo-2014.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.
- Mata globosa. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-9.
- Inflorescencias rojas al principio, tornando a amarillo claro en la madurez. Periodo de floración: junio-octubre. Reflorece si se eliminan las flores pasadas.
- Hojas finamente divididas, verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



13-mayo-2014



23-junio-2014



17-julio-2014



18-agosto-2014



23-septiembre-2014

## *Achillea x filipendulina*

Variedad: "Summer Gold"

Familia: Compositae

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 5-Mayo-2014.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.
- Mata globosa compada. Altura: 40 cm.
- Zonas climáticas 3-8.
- Inflorescencias amarillas que se tornan amarillo anaranjado cuando se pasan. Periodo de floración: junio-octubre, si se eliminan las flores pasadas.
- Hojas finamente divididas verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



13-julio-2015



13-mayo- 2014



23-junio-2014



17-julio-2014



18-agosto-2014



23-septiembre-2014

## ***Achillea ptarmica* L.**

Variedad: Pearl Double Crystall

Familia: Compositae

**Origen:** Europa.

**Plantación:** otoño-2008.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata densa, globosa, estolonífera. Altura: con flor 40 cm.
- Zonas climáticas 2-9.
- Inflorescencias con flores blancas a partir de junio. Las flores permanecen hasta otoño. Deben suprimirse las flores pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas pequeñas, lanceoladas verdes

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-mayo-2009



11-junio-2009



10-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009



## *Achillea clypeolata* Sm.

Variedad: Familia: Compositae

**Origen:** Europa.

**Plantación:** 14-mayo-2019.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. Perennifolia.
- Mata globosa, densa. Altura: con flor 40 cm.
- Zonas climáticas 4-8.
- Hojas finamente divididas, grises. Muy ornamentales.
- Inflorescencias con flores amarillas a partir de junio, hasta agosto. Deben suprimirse las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.


**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



27-junio-2008



5-junio-2019



1-julio-2019



6-agosto-2019



22-agosto-2019



5-septiembre-2019

## ***Agapanthus x hybrida***

Familia: *Amaryllidaceae*

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz. Semipermanente en invierno. Resiste las heladas débiles.
- Mata erizada, rizomatosa, hojas basales y raíces carnosas. Altura: 70 cm. con flor.
- Zonas climáticas 7-10.
- Flores blancas en umbelas sobre pedúnculos largos, en verano. Deben suprimirse las inflorescencias pasadas.
- Hojas verdes grandes alargadas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



Parque del Retiro  
27-julio-2019

## *Agastache foeniculum x rugosa*

Variedad: Blue Fortune

Familia: Lamiaceae

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2008.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: con flor 100 cm.
- Zonas climáticas 6-8.
- Inflorescencias azuladas. Debe pinzarse para estimular la emisión de inflorescencias nuevas y controlar el tamaño
- Hojas grandes, lanceoladas, aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-mayo-2009

11-junio-2009

5-agosto-2009

26-agosto-2009

14-septiembre-2009

## ***Agastache mexicana* (Kunth) Lint & Epling**

*Variedad:* Acapulco Orange

*Familia:* *Lamiaceae*

**Origen:** Norte de Méjico.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-mayo-2007.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas: 7-10.
- Inflorescencias con flores rosa salmón, pequeñas y muy abundantes. Deben suprimirse las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas pequeñas, acorazonadas, verde glauco, aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



30-mayo-2007



29-junio 2007



2-agosto-2007



31-agosto-2007



25-septiembre-2007



29-octubre 2007

## ***Agastache aurantiaca* (A.Gray) Lint & Epling**

Variedad: "Arizona Sunset"

Familia: Lamiaceae.

**Origen:** Méjico.

**Cultivo:** semilla. **Plantación:** 15-mayo-2017. **Obtentor:** Takii.

### **Características:**

- Vivaz, utilizada como frecuentemente como planta anual. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa, compacta. Altura: 25 cm., con flor.
- Planta aromática.
- Inflorescencias rosa claro. Floración limpia, excepto épocas muy calurosas.
- Hojas, pequeñas, ovaladas, verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



2-junio-2017

3-julio-2017

5 agosto-2017

1-septiembre-2017

17-septiembre-2017

3-octubre-2017

## *Ajania pacifica* (Nakai) K. Bremer & Humphries

Familia: Asteraceae

**Plantación:** 2015

**Origen:** Japón.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea desaparece parcialmente en invierno.
- Mata almohadillada, compacta. Altura: 50 cm.
- Zonas climáticas 5-9.
- Hojas lobuladas, verde-gris, con margen blanco, muy ornamentales.
- Floración en grupos de botones amarillos, en otoño. En invierno, cuando se pasan las inflorescencias, se cortan por la base, estando ya iniciado el desarrollo de los tallos del año siguiente

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



19-abril-2019



4-diciembre-2017

## *Ajuga reptans* L.

Familia: Lamiaceae

**Origen:** Europa.

**Plantación:** otoño-2017.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. Zonas sombrías y húmedas. Resiste a pleno sol aunque prefiere zonas sombrías y húmedas.
- Mata tapizante, cubresuelos. Altura: 15 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-9.
- Espigas azules en primavera.
- Hojas pequeñas, ovales, verde rojizo.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** medio.



Mayo-2018



## ***Alchemilla mollis* (Buser)**

**Rothm.**

Familia: Rosaceae

**Origen:** Sur y oeste de Europa,  
Caucaso.

**Plantación:** primavera-2007.

**Cultivo:** semilla.


**Características:**

- Vivaz. La parte aérea permanece en invierno.
- Mata tapizante, cubresuelos. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas orbiculares, con bordes aserrados. Color verde grisáceo. Ornamentales.
- Inflorescencias con flores amarillo verdoso, en verano y otoño.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.





## ***Alstroemeria ligtu* L.**

Variedad: Dandy Candy

Familia: *Alstroemeriaceae*

**Origen:** semilla.

**Plantación:** 15-mayo-2017. Media sombra.

**Zonas climáticas:** 8-10.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Raíces tuberosas. Se deteriora en verano a pleno sol. Brota con fuerza en otoño.
- Mata vestida. Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas 8-10.
- Flores en tonos rojos y rosas, con manchas características en los pétalos. Florece en primavera y otoño. Hay que suprimir las flores pasadas para estimular la producción de nuevas.
- Hojas medianas, alargadas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



5-junio-2019



## *Alyssum montanum* L.

Familia: *Brassicaceae*

**Origen:** Europa.

**Plantación:** primavera-2007.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno
- Zonas climáticas 3-7.
- Mata tapizante, compacta. Altura: 12 cm. con flor
- Inflorescencias amarillas, con flores muy pequeñas, abundantes a finales del invierno y principios de la primavera.
- Hoja, pequeñas, alargadas, grisáceas, con valor ornamental.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



27-diciembre-2007



17-febrero-2008



28-marzo-2008



27-junio-2008



21-enero-2008



20-marzo-2009

## ***Alcea rosea* L.**

Familia: *Malvaceae*

Variedad: *Spring Celebrities*

**Origen:** Europa.

**Plantación:** octubre-2017.

**Cultivo:** semilla. **Obtendor:** Takii

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea permanece en invierno. A menudo se utiliza como planta de temporada.
- Zonas climáticas 3-9.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 60 cm. con flor. Variedad enana.
- Flores dobles, de muchos colores. Deben suprimirse las flores secas. Floración primaveral, a veces remonta en otoño.
- Hojas grandes, redondeadas.

**Plagas y enfermedades:** roya.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-alto.



Mayo-2019



## ***Anacyclus pyrethrum* (L.) Lag.**

Familia: *Compositae*

Variedad: *Depressus* F. *Compactum* Silberkissen

**Origen:** Marruecos.

**Plantación:** primavera-2016.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. Suelos drenados.
- Mata tapizante. Altura: 10 cm. con flores. Crecimiento lento. Vegetación poco densa: invadida por malas hierbas.
- Zonas climáticas 3-9.
- Capítulos pequeños, blancos, abundantes. Botones cerrados rojos. Floración primaveral. Debe podarse en pleno verano.
- Hojas pequeñas, finamente divididas, plateadas, con valor ornamental.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



11-mayo-2016



27-dic-2016



26-abril-2016



19-enero-2018



17-mayo-2018

## *Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. & Hook.f.

Familia: Asteraceae

**Plantación:** 2016.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Zonas climáticas 3-9.
- Mata compacta, globosa, estolonífera. Altura: 50 cm. con flor.
- Hojas verde grisáceo, ornamentales.
- Inflorescencias con flores blancas a partir de junio. Las flores permanecen hasta otoño, aunque se deteriora su aspecto a partir de septiembre.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio.



26-abril-2017

19-junio-2017

27-julio-2017

21-septiembre-2017

20-noviembre-2017

19-enero-2018

## ***Anchusa azurea* Mill.**

Familia: *Boraginaceae*

Planta silvestre.

**Plantación:** primavera-2002.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-10.
- Flores azules en inflorescencias muy abiertas.  
Floración primaveral.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Mayo-2003

## ***Anemone x hybrida***

Variedades: Honorine Jobert,  
Konigin Charlotte

Familia: *Ranunculaceae*

**Origen:** Europa.

**Plantación:** primavera-2014.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Se extiende por medio de brotes de raíz.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Flores medianas, sencillas, blancas o rosas en primavera y otoño. Floración limpia.
- Hojas medianas, palmeadas. Interés ornamental.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.

Honorine Jobert 6-Mayo-2015



Konigin Charlotte 6-Mayo-2015

## ***Antennaria dioica* (L.) Gaertn.**

Variedad: Rubra

Familia: Compositae

**Plantación:** otoño-2016.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz perennifolia. Suelos ácidos, no encharcados.
- Mata tapizante. Altura: con flores 10 cm.
- Zonas climáticas 4-8.
- Hojas pequeñas grises muy ornamentales.
- Flores rojas en primavera. Corta duración. Poco interesantes.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017

15-junio-2017

17-julio-2017

5 agosto-2017

17-agosto-2017

3-octubre-2017



## ***Aquilegia caerulea* E.James**

Familia: *Ranunculaceae*

**Plantación:** otoño-2014.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta.  
Altura: 50 cm. con flor
- Zonas climáticas 3-9.
- Hojas medianas, compuestas con folíolos lobulados, ornamentales.
- Flores rojas y blancas en primavera, con característicos espolones.


**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



6-mayo-2015



## ***Arabis caucasica***

Familia: *Brassicaceae*

**Origen:** Europa.

**Plantación:** primavera-2007.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata rastrera (rosetas basales), cubresuelos. Altura: con flores 15 cm.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas pequeñas, agrupadas en rosetas, lanceoladas, de borde dentado.
- Flores pequeñas, blancas, en espigas.  
Florece en primavera.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



Alameda de Osuna  
8-febrero-2008

## ***Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.Bip.**

Sinónimo: *Chrysanthemum frutescens* L.

Variedad: Aramis White Eye

Familia: Asteraceae

**Origen:** Islas Canarias.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** mayo-2014.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas.
- Mata globosa, compacta. Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas 8-10.
- Flores en capítulos blancos. Florece prácticamente todo el período vegetativo. Floración limpia, excepto en pleno verano.
- Hojas lobuladas, verdes, pequeñas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



10-junio-2015



## ***Armeria maritima* (Mill.) Willd.**

Familia: *Plumbaginaceae*

Variedad: Splendens

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata almohadillada, compacta, cubresuelos. Altura: 15 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas verdes pequeñas, estrechas.
- Flores en cabezas semiesférica, de color rosa, en primavera. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



Mayo de 2005

## ***Artemisia x hybrida***

Variedad: Powis Castle

Familia: Asteraceae

Posible híbrido entre *A. arborescens* y *A. absinthium*

**Plantación:** otoño-2016.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: 50 cm.
- Zonas climáticas 6-8.
- Hojas finamente divididas, grises, muy ornamentales.
- Debe recortarse, cuando crece en exceso.

**Plagas y enfermedades:** pulgones. Actúa como reservorio (banker-plant) para el parásito *Aphidius* sp.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



4-diciembre-2017

## ***Artemisia ludoviciana* Nutt.**

Familia: *Compositae*

**Origen:** semilla.

**Plantación:** 25-abril-2005.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Estolonífera.
- Mata tapizante, cubresuelos. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-9.
- Toda la mata tiene un aspecto denso y con un colorido gris argénteo.
- Floración en primavera, con el mismo aspecto que las hojas.
- Hojas finamente divididas, pequeñas grises.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2005



28-julio-2005



28-diciembre-2005



29-marzo-2006



26-abril-2006

## *Artemisia absinthium* L.

**Familia:** Compositae

**Ajenjo**

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** mayo-2017.

**Características:**

- Vivaz perennifolia.
- Mata arbustiva. Altura: 40 cm. con flor. Toda la mata toma un tomo verde argénteo, más amarillento en verano.
- Zonas climáticas 3-9.
- Hojas finamente divididas, grisáceas, muy ornamentales.
- Flores poco significativas en primavera.

**Plagas/enfermedades:** pulgones en primavera. Funciona como planta reservorio.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017

15-junio-2017

17-julio-2017

17-agosto-2017

17-septiembre-2017

3-octubre-2017

## ***Artemisia absinthium* L.**

Variedad: Lambrook Silver

Familia: *Compositae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2008, en semisombra, aunque también da buen resultado a pleno sol.

### **Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno.
- Mata arbustiva, semicolgante. Altura: 35 cm con flor. Toda la mata toma un tono argénteo.
- Zonas climáticas 3-9.
- Hojas finamente divididas, grisáceas, muy ornamentales.
- Flores poco significativas en primavera

**Plagas/enfermedades:** pulgones en primavera. Funciona como planta reservorio.

**Orientación:** pleno sol-semisombra. **Mantenimiento:** bajo



11-junio-2009



2-agosto-2009



10-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009



## ***Aruncus dioicus* (Walter) Fernald**

Familia: Rosaceae

**Origen:** Europa. Hemisferio Norte.

**Plantación:** primavera-2014.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz. Rizomatosa. La parte aérea no permanece en invierno.
- Zonas climáticas 3-9.
- Mata vestida, esbelta.  
Altura: 60-150 cm. con flores.
- Hojas grandes, imparipinnadas, con folíolos de bordes dentados. Ornamentales.
- Panículas blancas en primavera.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



25-junio-2019



7-mayo-2015

## ***Aster amellus* L.**

Familia: Asteraceae

Variedad: Kobold

**Origen:** Italia.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** septiembre-2014.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas: 3-7
- Flores en capítulos malva. Florece a finales de verano, en condiciones de fotoperíodo decreciente. No plantar cerca de fuentes de luz: farolas, focos...
- Hojas pequeñas, estrechas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



30-septiembre-2015



## ***Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engl.**

Familia: *Saxifragaceae*

**Origen:** China.

**Plantación:** primavera-2014.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea desaparece en invierno.
- Suelos húmedos, encharcados.
- Mata globosa, rizomatosa. Altura: 40 cm.
- Zonas climáticas 4-8.
- Hojas grandes, orbiculares, con bordes lobulados. Principal interés ornamental.
- Inflorescencias en espigas blancas en primavera. Fugaces. Altura: 100 cm.
- Frutos decorativos.

**Plagas y enfermedades:** ataques de *Otiorhynchus*.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



7-mayo-2015

## *Pallenis maritima* (L.) Greuter

Sinónimo: *Asteriscus maritimus* (L.) Less.

Familia: *Asteraceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2005.

**Características:**

- Vivaz mediterránea. Sensible a las heladas. Perennifolia. A menudo se usa como planta de temporada.
- Mata rastrera, compacta, colgante. Altura: 20 cm.
- Capítulos amarillos. Floración continua durante el período vegetativo. Floración limpia.
- Hojas alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



5-mayo-2005



14-junio-2005



22-julio-2014



18-agosto-2005



14-septiembre-2005

## *Symphotrichum novae-angliae* (L.)

G.L.Nesom

*Sinónimo: Aster novae-angliae* L.

Variedad: Purple Dome

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** septiembre-2014.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa.  
Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas 2-8.
- Flores en capítulos morados. Florece a finales de verano, en condiciones de fotoperíodo decreciente. No plantar cerca de fuentes de luz: farolas, focos...
- Hojas pequeñas, alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra

**Mantenimiento:** medio.



30-septiembre-2015

## ***Astilbe x arendsii***

Variedad: Astary Rose

Familia: Saxifragaceae

**Plantación:** primavera-2014.

**Cultivo:** semilla. **Obtendor:** Benary

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa.  
Altura: con flor 30 cm.
- Zonas climáticas 4-8.
- Hojas medianas, compuestas, lustrosas, con folíolos lanceolados. Interés ornamental.
- Flores en panículas de tonos rosas, de corta duración. Las espigas pasadas deben eliminarse.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



6-mayo-2015



2-junio-2015

## *Astilbe rubra* Hook.f. & Thomson

Variedad

Familia: Saxifragaceae

**Cultivo:** división de matas.

### Características:

- Vivaz. Parte aérea semipermanente en invierno.
- Mata globosa-mata vestida.  
Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas compuestas, lustrosas, con foliolos lanceolados.
- Flores en espigas rosa claro de corta duración. Las espigas pasadas deben eliminarse.
- Resiste a pleno sol, pero prospera mejor con sombra por la tarde.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



16-mayo-2017



28-julio-2017

## ***Aubrieta x cultorum***

Familia: *Brassicaceae*

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata globosa tapizante, cubresuelos.  
Altura: 10 cm. con flores.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas pequeñas, lanceoladas, de bordes aserrados.
- Floración primaveral. Flores en muchos colores.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



mayo-2017



## ***Ballota pseudodictamnus* (L.) Benth.**

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Grecia.

**Plantación:** otoño-2016.

### **Características:**

- Vivaz, perennifolia.
- Mata extendida densa. Altura: 30 cm. con inflorescencias.
- Suelos drenados.
- Zonas climáticas 4-8
- Hojas pequeñas, redondeadas, aromáticas. Hojas y tallos cubiertos de un fino tomento, muy ornamentales
- Floración insignificante.

**Plagas/enfermedades:** Cicadelas.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



29-marzo-2017

26-abril-2017

3-julio-2017

22-agosto-2017

27-octubre-2017

20-noviembre-2017

## ***Baptisia australis* (L.) R.Br.**

Familia: Leguminosae

**Origen:** este de Estados Unidos.

**Plantación:** primavera-2018.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Larga duración.
- Mata arbustiva.  
Altura: 60- 150 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-9.
- Flores azules en espigas terminales.  
Floración primavera verano. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas.
- Hojas medianas, compuestas, imparipinnadas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.

4-abril-2019



## ***Bletilla striata* (Thunb.) Rchb.f.**

Familia: *Orchidaceae*

**Origen:** China y Japón.

**Plantación:** primavera-2016.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Orquídea terrestre. Suelos húmedos.
- Zonas climáticas 4-8.
- Mata vestida, esbelta.  
Altura: 30-50 cm.
- Flore típicas en racimos terminales en primavera y principios de verano.
- Hojas verdes, medianas, alargadas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.

Mayo-2018



## ***Brunnera macrophylla* (Adans.) I.M.Johnst.**

Familia: *Boraginaceae*

*Variedades.*

**Origen:** Europa.

**Plantación:** primavera-2016.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Suelos húmedos y bien drenados.
- Mata con hojas basales, cubresuelos. Planta rizomatosa. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas 6-8
- Hojas grandes, acorazonadas con variegaciones diversas. Algunas variedades no son estables: mutan al color verde. Principal característica ornamental.
- Inflorescencias alargadas, con flores pequeñas azules en primavera. Interesantes pero de corta duración.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



10-mayo-2019



28-julio-2019

## *Calamagrostis × acutiflora* (Schrad.) DC.

Variedad: Karl Foerster

Familia: *Poaceae*

**Plantación:** 25-abril-2009.

### **Características:**

- Vivaz de larga duración. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata erizada, densa. Altura: 1,2 m. con espigas.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Hojas lineares, verdes con bandas blancas.
- Espigas alargadas, doradas en verano.
- La planta seca con espigas es muy ornamental en invierno. Debe recortarse a finales de febrero.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



2-agosto-2010



5-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Calamagrostis brachytricha* Steud.**

Familia: *Poaceae*

**Origen:** Corea.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 2016.

**Características:**

- Gramínea vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata erizada, densa. Altura: 120 cm. con espigas.
- Zonas climáticas 4-9.
- Hojas color verde claro.
- Espigas de color marrón claro que tornan a amarillo. La planta seca con espigas es muy ornamental en invierno. Debe recortarse a finales de febrero.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio.



26-abril-2017

19-junio-2017

22-agosto-2017

21-septiembre-2017

20-diciembre-2017

19-enero-2018

## ***Campanula persicifolia* L.**

Familia: *Campanulaceae*

**Origen:** Europa, Norte de África.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta.  
Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Flores azules campanuladas, en espigas terminales. Floración a finales de la primavera. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



Alameda de Osuna 7-junio-2013

## ***Campanula portenschlagiana* Schult.**

Sinónimo: *Campanula muralis* Port. ex A.DC.

Familia: *Campanulaceae*

**Origen:** sur de Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. Planta rupícola.
- Mata tapizante, compacta. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-8.
- Flores azules campanuladas, en inflorescencias cortas. Floración entre junio y agosto. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas.
- Hojas redondeadas, con bordes dentados.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.

11-mayo-2007



junio-2015



julio-2019



## *Canna x generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey

Variedad: Tropical Salmon/Tropical Bronze

Familia: Cannaceae

**Cultivo:** semilla. **Obtentor:** Takii.

**Plantación:** 5-mayo-2015.

### Características:


- Vivaz utilizada a menudo como anual. La parte aérea desaparece en invierno. Teme los grandes fríos. Resiste el encharcamiento.
- Mata vestida, esbelta. Variedad enana: alcanza los 30-50 cm. con flor, al final de la temporada.
- Zonas climáticas 7-10. Por debajo de 7 hay que levantar los rizomas en invierno.
- Hojas rojizas con valor ornamental secundario.
- Flores rojas. Deben eliminarse las flores secas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio-alto.



18-mayo-2016



15-junio-2016




18-julio-2016



19-agosto-2016



16-septiembre-2016



4-octubre-2016

## ***Canna x generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey**

Variedad obtenida por Juan Bordas.

Familia: Cannaceae

**Cultivo:** división de matas.

### **Características:**

- Vivaz utilizada como anual. La parte aérea desaparece en invierno. Teme los grandes fríos. Gran resistencia al calor.
- Mata vestida, esbelta. Crecimiento vigoroso: alcanza los 100-150 cm. con flor al final de la temporada.
- Zonas climáticas 7-10. Por debajo de 7 hay que levantar los rizomas en invierno.
- Hojas rojizas con nerviaciones anaranjadas. Muy ornamentales.
- Flores anaranjadas. Deben eliminarse las flores secas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



## ***Carex pendula* Huds**

Familia: *Cyperaceae*

**Origen:** Europa, Asia, África.

**Cultivo:** semilla

**Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. Tolera el encharcamiento. Tiende a ser invasora.
- Mata erizada, muy compacta. Altura: 150 cm. con inflorescencias. Sistema radical muy potente: compite ventajosamente incluso con la grama.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas medianas verdes, lineares, arqueadas, con nervio central marcado.
- Inflorescencias alargadas, arqueadas, con amentos colgantes.
- El porte, las hojas y las inflorescencias son sus principales características ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Parque del Retiro  
6-agosto-2019



## ***Carex testacea* Sol. ex Boott**

Variedad: Praerie Fire

Familia: *Cyperaceae*

**Origen:** Nueva Zelanda.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz, Permanece en invierno.
- Mata erizada, compacta. Altura: 30 cm.
- Hojas verde amarillo. Adquiere tonos anaranjados en otoño.
- No reacciona bien ni a la poda ni a la división de matas (no es una gramínea).

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.



Otoño-2011



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



3-junio-2011



16-junio-2011

## ***Carex oshimensis* Nakai**

Variedad: Evergold

Familia: *Cyperaceae*

**Origen:** Europa, Asia, África.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. Tolera el encharcamiento.
- Mata erizada, compacta, semi colgante. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas 7-9.
- Hojas alargadas, pequeñas verdes con una banda blanca en el centro, con nervio central marcado, arqueadas. Principal característica ornamental.
- Inflorescencias insignificantes.
- No reacciona bien ni a la poda ni a la división de matas (no es una gramínea).

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019



## ***Centaurea cineraria* L.**

Variedad: Candidissima

Familia: *Asteraceae*

Origen: Isla de Capraia (Italia).

Cultivo: semilla.

Plantación: 15-mayo-2009

### **Características:**

- Vivaz. Permanece en invierno. No tolera el encharcamiento.
- Mata extendida en forma de roseta basal, de base leñosa, compacta.  
Altura: 20-40 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-9.
- Hojas medianas blanco gris, lobuladas. Son su principal característica ornamental.
- Capítulos gruesos, amarillos. Se presentan a partir del segundo año en verano. Muy interesantes pero de corta duración. Deben recortarse una vez pasados.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



21-mayo-2009



11-junio-2009



5-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Centaurea montana* L.**

Familia: *Asteraceae*

**Origen:** zonas montañosas del sur de Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata extendida.  
Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Capítulos azules. Deben recortarse una vez pasados.
- Hojas medianas, lanceoladas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



25-mayo-1999

## ***Ceratostigma plumbaginoides* Bunge**

Familia: *Plumbaginaceae*

**Origen:** China.

**Cultivo:** esquejes.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata rastrera. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas pequeñas, ovaladas. Adquieren tonos rojizos en invierno.
- Flores azules en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



noviembre-2016



## *Ceratostigma willmottianum* Stapf

Familia: *Plumbaginaceae*

**Origen:** oeste de China.

**Cultivo:** esquejes.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Pequeño arbusto caducifolio.
- Mata arbustiva. Altura: 70 cm.
- Zonas climáticas 8-9.
- Hojas pequeñas, ovaladas.
- Flores azules en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



11-junio-2019



## *Chasmanthium latifolium* (Michx.) H.O.Yates

Familia: *Poaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** esquejes.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 70 cm. con espigas.
- Zonas climáticas 4-10.
- Hojas verdes, medianas, alargadas.
- Emite las espigas a mediados del verano. Frutos decorativos.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



agosto-2019



## *Chrysanthemum haradjanii* Rech.f.

Familia: Compositae

**Origen:** Siria, Turquía.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 2014.

**Características:**

- Vivaz de larga duración. Permanece en invierno. Resistente a la sequía.
- Mata extendida, compacta, semi colgante. Altura: 15 cm. sin flor.
- Zonas climáticas 8-10.
- Hojas ornamentales pequeñas, gris claro, finamente divididas.
- Floración ocasional. Flores amarillas en inflorescencias terminales, difusas, en junio-julio.
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



11-mayo--2016



2-junio-2016



5-julio-2016



21-febrero-2017



26-abril-1017

## *Leucanthemum x superbum* (J.W.Ingram) D.H.Kent

Sinónimo: *Chrysanthemum x superbum*

Familia: *Compositae*.

Variedad: Alaska

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: con flor 100 cm.
- Zonas climáticas 3-7.
- Floración principal en primavera y principios de verano. Capítulos blancos con el centro amarillo. Deben suprimirse las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas grandes alargadas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** ocasionalmente pulgones.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-alto.



31-mayo-2018

31-marzo-2018



## ***Chrysanthemum x morifolium***

Variedades de jardinería

Familia: *Compositae*

**Origen:** híbridos complejos entre diversas especies chinas y japonesas, principalmente *C. indicum* y *C. morifolium*.

**Plantación:** octubre-2018.

### **Características:**

- Vivaz. Semipermanente en invierno.
- Mata globosa. Altura: con flor 30-60 cm. Algunas variedades de porte extendido.
- Zonas climáticas 5-9.
- Floración en otoño, con días cortos: duración entre uno y dos meses. Capítulos de muchas formas y colores: clasificación por tipos de floración.
- No plantar junto a farolas, ya que alteran el fotoperíodo.
- Necesitan entutorado.
- Hojas medianas lobuladas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** fuertes ataques de pulgones, sobre todo en cultivo.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-alto.



octubre-2019

## *Chrysanthemum x coreanum*

Familia: Compositae

**Origen:** Híbridos entre *C. coreanum* y *C. morifolium*.

**Plantación:** primavera-2014.


### **Características:**

- Vivaz caducifolia. Semipermanente en invierno.
- Mata globosa, compacta. Altura: con flor 50 cm.
- Zonas climáticas 5-9.
- Floración en otoño con días cortos. Flores en capítulos pequeños de muchos colores y formas. No plantar cerca de farolas, ya que alteran el fotoperíodo.
- Hojas pequeñas, lobuladas.

**Plagas/enfermedades:** fuertes ataques de pulgones.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-alto.



26-octubre-2015



## ***Cistus × skanbergii* Lojac.**

Familia: Cistaceae

**Origen:** *Cistus monspeliensis* x *Cistus parviflorus*.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** marzo-2016.

### **Características:**

- Vivaz, perennifolia. Suelos drenados.
- Mata arbustiva. Altura: 75 cm.
- Reacciona bien a la poda.
- Zonas climáticas 4-9.
- Hojas medianas, alargadas, verde grisáceo.
- Flores muy grandes, rosas, bastante fugaces, en primavera. Floración limpia.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



30-mayo-2018

## *Cistus x hybrida*

Variedad: Corbariensis Variegata

Familia: Cistaceae

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, perennifolia.
- Mata arbustiva, compacta, semicolgante. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas 8-11.
- Reacciona bien a la poda.
- Hojas variegata, pequeñas, alargadas.
- Flores medianas, blancas, en primavera, bastante fugaces.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.





## ***Cneorum tricoccon* L.**

Familia: *Rutaceae*

**Origen:** zona mediterránea.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva, compacta, semiesférica, semicolgante.  
Altura: 50 cm. Porte ornamental.
- Reacciona bien a la poda.
- Hojas pequeñas, alargadas.
- Frutos pequeños, alargados, rojos, en grupos de tres.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.



20-enero-2017



29-marzo-2017



19-junio-2017



21-septiembre-2017



20-diciembre-2017

## ***Convolvulus cneorum* L.**

Familia: *Convolvulaceae*

**Origen:** mediterráneo central, norte de África.

**Plantación:** junio-2017.

### **Características:**

- Vivaz perennifolia.
- Mata extendida, colgante. Porte ornamental. Altura: 60 cm.
- Zonas climáticas 4-9.
- Floración en primavera. Flores blancas, campanuladas, grandes.
- Hojas verde-gris, plateadas, muy ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



19-junio-2017

27-octubre-2017

15-febrero-2018

5-abril-2018

20-abril-2018

11-mayo-2018

## ***Coprosma repens* A.Rich.**

Familia: Rubiaceae

**Origen:** Nueva Zelanda. Origen híbrido.

### **Características:**

- Vivaz perennifolia. Crecimiento muy lento.
- Mata extendida, compacta. Altura: 30cm.
- Zonas climáticas: 3-9.
- Hojas pequeñas, ovaladas. Muy ornamentales. Según las variedades se presentan diversos coloridos foliares.
- Flores insignificantes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



31-mayo-2018



16-marzo-2015

## ***Coreopsis tinctoria* Nutt.**

Familia: *Compositae*

**Origen:** Centro y Norte de América

**Cultivo:** esqueje, división de matas.

**Plantación:** otoño-2008.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa, compacta. Altura: 50 cm. con flor.
- Hojas pequeñas alargadas.
- Zonas climáticas 5-9.
- Flores pequeñas, en tonos rojos o amarillos. Deben pinzarse las flores pasadas para que emita nuevas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



5-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet**

Variedad: Corky Yellow

Familia: *Asteraceae*

**Origen:** América del Norte.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2009.

**Características:**

- Vivaz, caducifolia.
- Mata globosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-9.
- Hojas medianas alargadas.
- Capítulos amarillos con manchas rojas en el centro. Hay que eliminar las flores pasadas para favorecer la emisión de flores nuevas.

**Plagas/enfermedades:** sensible al oídio.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio.



21-mayo-2009



11-junio-2009



29-junio-2009



5-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet**

Variedad: Early Sunrise

Familia: *Asteraceae*

**Origen:** América del Norte.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2009.

**Características:**

- Vivaz, caducifolia.
- Mata globosa. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-9.
- Hojas medianas alargadas.
- Capítulos amarillos. Hay que eliminar las flores pasadas para favorecer la emisión de flores nuevas.

**Plagas/enfermedades:** sensible al oídio.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio.



21-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

***Coreopsis grandiflora***  
**Hogg ex Sweet**  
Variedades



Var. **Santa Fé** 11-mayo-2011



Var. **Early Sunrise** 31-mayo-2011



Var. **Corky Yellow** 30-mayo-2011



Var. **Illico** 30-mayo-2011

## ***Crambe cordifolia* Steven**

Familia: *Brassicaceae*

**Origen:** Cáucaso.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** mayo-2014.

**Características:**

- Vivaz. No permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: hasta 1,8 m. con flor. Parte vegetativa 50 cm. Porte ornamental.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas muy grandes (30 cm. de diámetro), acorazonadas, verdes. Ornamentales.
- Inflorescencias de gran desarrollo, con abundantes flores pequeñas, blancas. Floración junio-julio. Fugaz.

**Plagas/enfermedades:** orugas, pulgones y otros.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** alto.



7-mayo-2015





***Crambe marítima* L.**  
Familia: *Brassicaceae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2016.

**Características:**

- Vivaz. No permanece en invierno.
- Roseta basal. Altura: hasta 100 cm. con flor. Porte ornamental.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas grandes, alargadas, glaucas. Ornamentales.
- Inflorescencias de gran desarrollo, con flores blancas. Floración junio-julio. Hay que entutorar las inflorescencias.

**Plagas/enfermedades:** orugas, pulgones y otros.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-alto.



22-agosto-2017



abril 2018

## ***Crocsmia × crocosmiiflora* (Lemoine) N.E.Br.**

Variedad: Carmine Brillant

Familia: *Iridaceae*

**Plantación:** verano-2016.

### **Características:**

- Vivaz, desaparece en invierno. Desaparece en invierno. Se extiende rápidamente por medio de órganos subterráneos (cormos).
- Mata erizada, cubresuelos. Altura: con flor 30 cm.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas medianas, alargadas, verde glauco.
- Floración en primavera. Flores rojas en espigas. Floración limpia.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



26-abril-2017



20-junio-2017



24-julio-2017



21-septiembre-2017



20-diciembre-2017



19-enero-2018

## *Crocasmia × crocosmiiflora* (Lemoine) N.E.Br.

Variedad: Lucifer

Familia: *Iridaceae*

**Plantación:** primavera-2014.

### **Características:**

- Vivaz con cormos subterráneos. Desaparece en invierno. Se extiende por medio de los órganos subterráneos.
- Mata erizada. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-8.
- Floración en primavera y principios de verano. Flores rojas grandes en espigas arqueadas.
- Hojas grandes, alargadas, verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



4-julio-2016

## ***Cyclamen hederifolium* Aiton**

Familia: *Primulaceae*

**Origen:** sur de Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea desaparece en verano.
- Mata rastrera con tubérculos, cubresuelos invernol. Altura: con flor 10 cm.
- Zonas climáticas 5-8.
- Floración en otoño justo antes o a la vez que emisión de las hojas.
- Hojas glaucas con dibujos verdes irregulares, muy ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



El Capricho  
octubre -2007



Febrero de 2008

## *Cyrtomium falcatum* (L. f.) C. Presl

Familia: Dryopteridaceae

**Origen:** Japón.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata con frondes basales. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas 8-10.
- Frondes grandes, imparipinnadas, verde oscuro, brillantes, de consistencia coriácea. Muy ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra. Zonas umbrosas y húmedas.

**Mantenimiento:** bajo.



Parque del Retiro 19-abril-2019

## ***Cynara cardunculus* L.**

Variedad silvestre

Familia: Compositae

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea desaparece en pleno verano, después de florecer.
- Hojas muy grandes, compuestas, espinosas, verde claro, grisáceo. Brotan en otoño.
- Roseta basal. Altura: con flor 170cm.
- Floración en primavera y principios de verano. Flores muy grandes en capítulos blancos azulados. Debe eliminarse la mata entera en verano, ya que se seca después de florecer.

**Plagas/enfermedades:** frecuentemente pulgones.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



Junio-2018

15-abril-2018



31-mayo-2018

## ***Dalhia x hybrida***

Variedad: Red Pigmeé

Familia: *Compositae*

**Origen:** híbridos de *D. pinnata*, *D. coccinea*,  
*D. rosea*. Méjico.

**Cultivo:** esqueje, división de mata.

**Plantación:** mayo-1994.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Raíz tuberosa, con yemas sólo en cuello de la raíz. Debe acolcharse en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 7-10.
- Hojas verde glauco con interés ornamental, grisáceas.
- Capítulos rojos tipo semicactus. Hay que eliminar las flores secas, para estimular la emisión de nuevas.

**Plagas/enfermedades:** muy sensible al oídio.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** alto.



Dalhia Red Pigmeé 3-julio-1995

## *Dahlia x hybrida*

Variedad: Pablo

Familia: *Compositae*

**Origen:** híbridos de *D. pinnata*, *D. coccinea*, *D. rosea*. Méjico.

**Cultivo:** esqueje, división de mata.

**Plantación:** 15-abril-2009.

### Características:

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Raíz tuberosa, con yemas sólo en cuello de la raíz. Debe acolcharse en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 7-10.
- Hojas verde glauco con interés ornamental, grisáceas.
- Capítulos rosa salmón tipo semicactus. Hay que eliminar las flores secas, para estimular la emisión de nuevas.

**Plagas/enfermedades:** oídio.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** alto.



4-mayo-2009

10-junio-2009

15-julio-2011

10-agosto-2009

26-agosto-2009

14-septiembre-2009



## *Dianthus caryophyllus*

Variedad: Can Can Scarlet

Familia: *Caryophyllaceae*.

**Cultivo:** semilla. Obtentor: Sakata.

**Plantación:** 1-mayo-2006.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Vivaz de gran duración.
- Mata globosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Hojas verde glauco con interés ornamental.
- Zonas climáticas 7-10.
- Flores rojas. Hay que eliminar las flores secas, para estimular la emisión de nuevas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-junio-2006



22-junio-2006



19-julio-2006



10-agosto-2006



13-septiembre-2006



1-octubre-2006

## *Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus

Variedad: Suntropics Cooper

Familia: *Aizoaceae*

Zonas climáticas: 7-10

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 10-mayo-2019.

### Características:

- Vivaz, permanece en invierno. Planta crasa resistente al frío. Suelos drenados.
- Mata rastrera, compacta, cubresuelos. Altura: 15 cm. con flor.
- Hojas verde glauco con interés ornamental.
- Zonas climáticas 7-9.
- Flores en varios colores. Floración de mayo a agosto. Floración limpia. La flor se cierra en el centro del día.
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



14-mayo-2019



3-junio-2019



1-julio-2019



5-agosto-2019



5-sept-2019

## *Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus

Variedad: Suntropics Red.

Familia: *Aizoaceae*

Zonas climáticas: 7-10

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 10-mayo-2019.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Planta crasa resistente al frío. Suelos drenados.
- Mata rastrera, compacta, cubresuelos. Altura: 15 cm. con flor.
- Hojas verde glauco con interés ornamental.
- Zonas climáticas 7-9.
- Flores en varios colores. Floración de mayo a agosto. Floración limpia. La flor se cierra en el centro del día
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



14-mayo-2019



3-junio-2019



1-julio-2019



5-agosto-2019



5-sept-2019

## ***Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv.**

Familia: *Poaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 70 cm. con flor.
- Hojas verdes con interés ornamental.
- Zonas climáticas 4-8.
- Espigas amarillas. Floración en verano. Hay que eliminar las inflorescencias secas antes de marzo.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



## ***Dianthus deltoides* L.**

Variedad: Brillant

Familia: *Caryophyllaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 25-marzo-2011.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata rastrera, colgante. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8
- Hojas pequeñas. verde claro.
- Flores rosas pequeñas, en mayo. Hay que eliminar las flores secas, para estimular la emisión de nuevas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



16-junio-2011

8-julio-2011

## *Dianthus plumarius*

Variedad: Sweetness mix

Familia: *Caryophyllaceae*.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 10-mayo-2008.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata globosa, semicolgante.  
Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Flores en tonos rosas, medias.  
Hay que eliminar las flores secas, para estimular la emisión de nuevas. Florece el primer año.
- Hojas verde glauco, ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



13-junio-2008



10-julio-2008



4-agosto-2008

## *Lamprocapnos spectabilis*

(L.) Fukuhara

Sinónimo: *Dicentra spectabilis*

(L.) Lem.

Familia: *Papaveraceae*

**Origen:** Japón.

**Cultivo:** semilla.


**Características:**

- Vivaz. La parte aérea se deteriora en verano y no permanece en invierno. Planta rizomatosa.
- Mata globosa, semicolgante. Altura: 40 cm.
- Zonas climáticas: 2-8.
- Inflorescencias arqueadas con flores acorazonadas, colgantes, de color rosa y blanco.
- Hojas medianas, compuestas, con folíolos recortados verde claro, muy ornamentales.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** medio.



4-mayo-2009

## *Dicentra eximia* (Ker Gawl.) Torr.

Familia: *Papaveraceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.


**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Planta rizomatosa.
- Mata con hojas basales. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-9.
- Inflorescencias rectas con flores acorazonadas, colgantes, de color rosa carmín, en primavera-verano.
- Hojas medianas, profundamente divididas, parecidas a las de los helechos, muy ornamentales.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** medio.





## *Digitalis purpurea* L.

Familia: *Scrophulariaceae*.

**Origen:** Europa, Asia y África.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Bianual o vivaz de corta duración. La parte aérea no permanece en invierno. Se autosiembra.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 150 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-8.
- Inflorescencias muy grandes con flores campanuladas abundantes en su parte superior, colgantes, de muchos colores. Floración en primavera. Hay que eliminar las inflorescencias secas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** medio.



*Digitalis purpurea*  
9-mayo-2009

*Digitalis purpurea* "Heywoodii"  
7-mayo-2015



## *Drosanthemum floribundum* (Haw.) Schwantes

Familia: Aizoaceae

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Vivaz de larga duración, permanece en invierno. Planta crasa resistente al frío.
- Mata extendida, cubresuelos. Altura: 15 cm. con flor.
- Zonas climáticas 7-10.
- Flores pequeñas, rosa, claro. Floración en primavera. Floración limpia.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



19-mayo-2018



5-agosto-2019

## *Echinacea purpurea* (L.) Moench

Familia: *Compositae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla y esqueje

**Plantación:** otoño y primavera.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Muchas variedades.
- Mata vestida, esbelta. Porte más o menos compacto. Variedades de alturas muy variables.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas grandes, alargadas, verde claro. Se deterioran mucho en pleno verano.
- Capítulos de muchos tamaños, colores y formas. Es necesario eliminar los capítulos pasados para estimular la emisión de nuevos.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-alto.



*Echinacea purpurea*  
"Primadonna Deep Pink"  
19-junio-2017



*Echinacea purpurea*  
"Cheyenne Spirit"  
19-junio-2017

## ***Epimedium × versicolor* E.Morren**

Variedad: Sulphureum

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 25-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata almohadillada, semicolgante. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas medianas, acorazonadas, verde claro, amarillento, con tintes rojos las nuevas. Ornamentales.
- Flores pequeñas, interesantes.

**Enfermedades:** ataques de *Otiorhynchus*.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



3-junio-2011



16-junio-2011

## ***Echinops ritro* L.**

Familia: Compositae

**Origen:** existe silvestre en la zona centro de España.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Suelos drenados.
- Mata abierta. Altura: 90 cm.
- Zonas climáticas 3-8.
- Inflorescencias esféricas, azuladas.
- Hojas medianas, lobuladas, verde claro. Envés grisáceo.

**Enfermedades:** ataques de *Otiorhynchus*.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



## ***Erigeron glaucus* Ker Gawl.**

Familia: Compositae

**Origen:** Oeste de Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata extendida. Altura: 90 cm.
- Zonas climáticas 3-8.
- Capítulos malva claro con centro amarillo. Hay que eliminar las flores secas. Floración primavera (verano).
- Hojas medianas, lobuladas, alargadas, verde claro

**Enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-junio-2019



7-mayo-2015

## *Erysimum linifolium* (Pers.) J.Gay

Variedad: Bowles Mauve.

Familia: Brassicaceae.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2010.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-8.
- Flores malva, sobre espigas. Hay que eliminar las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas. Emite inflorescencias desde finales del invierno hasta muy avanzado el otoño.
- Hojas pequeñas, alargadas, verde glauco. Ornamentales

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio.



Parque del Oeste 24-abril-2011



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



16-junio-2011



18-agosto-2011

## *Erysimum x hybrida*

Variedad: Spice Island

Familia: *Brassicaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.  
Dura dos o tres temporadas.
- Mata extendida, compacta.  
Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 6-8.
- Hojas pequeñas, alargadas,  
verde glauco.
- Flores rojas, sobre espigas.  
Hay que eliminar las  
inflorescencias pasadas para  
estimular la emisión de  
nuevas. Floración primaveral.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



7-abril-2016



## ***Ageratina altissima* (L.)**

**R.M.King & H.Rob.**

Sinónimo: *Eupatorium rugosum* Houtt.

Variedad: Chocolate

Familia: Compositae

**Cultivo:** esqueje, división de matas.

**Plantación:** 2016.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Larga duración.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, ovaladas, puntiagudas. De color púrpura en la brotación, tornan al verde a lo largo de la temporada de crecimiento.
- Corimbos con flores blancas, pequeñas, abundantes. Floración en otoño. Las plantas deben podarse a nivel del suelo una vez terminada la floración.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.

19-abril-2019



26-septiembre-2018



15-junio-2019

## *Euphorbia cyparissias* L.

Familia: *Euphorbiaceae*.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-abril-2012.

### Características:

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Suelos drenados. Emite brotes de raíz.
- Mata rastrera, compacta, cubresuelos. Se extiende por medio de estolones. Altura: 25 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Hojas muy pequeñas, aciculares, verde glauco.
- Flores amarillas en primavera, antes de generalizarse la brotación.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



10-mayo-2012



23-julio-2010



20-julio-2010



28-agosto-2012



15-septiembre-2010



20-octubre-2010

## *Euphorbia myrsinites* L.

Familia: Euphorbiaceae

**Origen:** esqueje.

**Plantación:** 5-Mayo-2014.

**Características:**

- Vivaz de larga duración, permanece en invierno. Crecimiento medio.
- Mata extendida, cubresuelos, compacta y colgante. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 5-8.
- Hojas, medianas, abundantes, azuladas con interés ornamental.
- Inflorescencias amarillas en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



13-mayo-2014



17-julio-2014



18-agosto-2014



23-septiembre-2014



6-abril-2016

***Euphorbia characias* L.**  
*Familia: Euphorbiaceae*

**Origen:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2014.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Se autosiembra con facilidad.
- Mata arbustiva. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Hojas medianas, alargadas, glaucas con interés ornamental.
- Inflorescencias espectaculares, color amarillo verdoso, en primavera.
- Muchas variedades.
- Látex irritante.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



mayo-2016



Julio-2019

## *Euryops pectinatus* (L.) Cass.

Familia: Compositae.

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensibles al frío. Rebrotan, en caso de helada.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: con flor.
- Zonas climáticas 8-10.
- Capítulos amarillos algo dispersos. Floración continua durante todo el período vegetativo. Floración limpia.
- Hojas profundamente divididas, grisáceas. Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



mayo-2018

## ***Festuca glauca* Vill.**

Familia: *Poaceae*.

**Origen:** semilla.

**Plantación:** abril-2005.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 25 cm. con flor.
- Zonas climáticas 4-7.
- Hojas glaucas con interés ornamental, grisáceas.
- Inflorescencias azuladas en mayo junio. A partir del segundo año.
- Muchas variedades.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2005



4-junio-2005



24-junio-2005



27-julio-2005



24-agosto-2005



6-diciembre-2005

## ***Farfugium japonicum* (L.) Kitam.**

Variedad: Aureo Maculatum

Familia: *Compositae*

**Origen:** división de matas.

**Plantación:** primavera-2017.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata con hojas basales.  
Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas 7-9.
- Hojas grandes, redondeadas, brillantes, dentadas, verdes con manchas amarillas irregulares, ornamentales.
- Florece a finales de otoño. Capítulos amarillos escasos.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019

## ***Fuchsia magellanica* Lam**

Variedad: Riccartoni

Familia: *Onagraceae*

**Origen:** Chile y Argentina. Variedad híbrida.

**Origen:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2005.

### **Características:**

- Vivaz, caducifolia. Resistente al frío. No resiste a pleno sol.
- Mata arbustiva. Altura: hasta 150 cm.
- Zonas climáticas 7-9.
- Hojas pequeñas, ovaladas.
- Flores pequeñas con tubo y sépalos rojos y pétalos violeta.  
Florece en verano y otoño.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



5-mayo-2005

27-mayo-2005

14-junio-2005

7-julio-2005

22-julio-2005



## ***Gaura lindheimeri* Engelm. & A.Gray**

Familia: *Onagraceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 10-Abril-2014.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno.
- Mata arbustiva, semicolgante. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-8.
- Hojas alargadas verdes a menudo con manchas rojizas pequeñas.
- Flores blancas, dispersas, sobre tallos arqueados. Hay que eliminar las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas. Las flores tienden a pasar del blanco a rosado, antes de pasarse.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



10-mayo-2015

## *Gaillardia x grandiflora* Van Houtte

Variedad: Arizona Sun/ Red Shades

Familia: *Compositae*

**Origen:** semilla.

**Plantación:** 15-abril-2009.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Se autosiembra con facilidad: la variedad se altera.
- Mata globosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 2-9.
- Hojas medianas, alargadas, verdes.
- Arizona Sun: capítulos grandes, amarillos con el centro rojo. Arizona Red Shades: capítulo rojo, con centro rojo oscuro.
- Frutos ornamentales. Deben eliminarse para estimular nuevas floraciones.
- Muchas variedades.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio-alto.



5-mayo-2009



21-junio-2009



11-julio-2009



5-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Gazania rigens* (L.) Gaertn.**

Variedad: Kiss Orange Flame

Familia: Compositae

**Origen:** Sudáfrica.


**Cultivo:** semilla. **Obtentor:** Syngenta.

**Plantación:** primavera 2008.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas.
- Roseta basal, semicolgante. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-11.
- Capítulos grandes, amarillos con el centro rojo. Se cierran en el centro del día. Deben suprimirse las flores pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas alargadas verde glauco. Ornamentales.
- Muchas variedades.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado. **Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio-bajo.



21-mayo-2009

11-junio-2009

5-agosto-2009

26-agosto-2009

14-septiembre-2009

## ***Geranium x hybrida***

Variedad: *Johnson Blue*

Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** división de matas.

**Plantación:** otoño-2004.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. No soporta bien los fuertes calores. Si se poda en agosto rebrota en otoño.
- Híbrido entre *G. himalayense* y *G. pratense*.
- Mata extendida. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-7 (8).
- Hojas palmeadas, verde claro.
- Flores medianas, azul claro. Floración limpia hasta pleno verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



3-junio-2005

## *Geranium x cantabrigiense* P.F.Yeo

Variedad: Karmina

**Cultivo:** división de matas.

**Plantación:** primavera-2015.

### **Características:**

- Vivaz, semipersistente en invierno. Soporta bien los fuertes calores, a pleno sol.
- Mata extendida, cubresuelos. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-7.
- Flores pequeñas, rosas. Floración limpia. Primavera-verano.
- Hojas pequeñas palmeadas, verde claro. Coloración otoñal muy interesante.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



11-mayo-2016

2-junio-2016

21-septiembre-2016

28-diciembre-2016

20-enero-2017

29-marzo-2017

26-abril-2017

## ***Geranium macrorrhizum* L.**

Variedad: Spessart

Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** división de matas.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Vivaz, semipersistente en invierno. Rizomatosa. Soporta bien los fuertes calores.
- Mata extendida. Altura: 25 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas plameadas, verde claro. Coloración otoñal interesante.
- Flores medianas, blancas. Floración limpia. Primavera-verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Mayo-2019

## ***Geranium sanguineum* L.**

Variedad: Vision Rose

Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Origen:** Europa, Asia.

**Plantación:** invierno-2004.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores.
- Mata rastrera de base leñosa. Altura: 15 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8.
- Hojas pequeñas, palmeadas, profundamente divididas, verde claro. Coloración otoñal muy interesante.
- Flores pequeñas, rosas, en primavera y verano. Floración dispersa. Floración limpia.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo-medio.



9-mayo-2004



24-junio-2005



24-agosto-2005



26-marzo-2006



25-mayo-2006

## ***Geranium phaeum* L.**

Variedad: Samobor

Familia: Geraniaceae

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** esqueje, división de matas.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores, a pleno sol.
- Mata extendida. Altura: 25 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-7.
- Hojas medianas lobuladas, verde claro con mancha oscura. Coloración otoñal interesante.
- Flores pequeñas, malva oscuro, en primavera y verano. Floración limpia. Primavera-verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



19-abril-2019



## Glaucium flavum

Familia: Papaveraceae

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2016.

### Características:

- Bianual o vivaz de corta duración, permanece en invierno.
- Roseta basal. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 6-9.
- Hojas grandes, glaucas, alargadas, profundamente divididas. Muy ornamentales.
- Floración interesante, que cuando se pasa devalúa el aspecto de la planta. Debe eliminarse para provocar una vigorosa brotación de hojas.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio.



21-febrero-2017

26-abril-2017

31-julio-2017

26-septiembre-2017

20-diciembre-2017

5-abril-2018

## ***Glechoma hederacea* L.**

Variedad: Variegata.

Familia: *Lamiaceae*.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 25-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata tapizante, cubresuelos, colgante. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas 2-10.
- Hojas pequeñas, redondeadas, verdes con manchas blancas. Tienden a volverse totalmente verdes.
- Flores muy pequeñas, poco significativas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011

18-abril-2011

11-mayo-2011

30-mayo-2011

16-junio-2011

8-julio-2011

## ***Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb.**

Familia: *Poaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2005.

### **Características:**

- Gramínea vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores. Soporta zonas encharcadas.
- Mata erizada. Altura: 50-100 cm.
- Zonas climáticas 7-9.
- Hojas alargadas, con bandas blancas. Muy ornamentales.
- Espigas marrones en verano. Poco interesantes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



9-mayo-2005

24-junio-2005

5-agosto-2005

6-diciembre-2005

29-marzo-2006

26-abril -2006

## ***Helenium autumnale* L.**

Variedad: Rotgold Hibrids

Familia: *Compositae*

**Origen:** este de Norteamérica.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata globosa. Altura: 80 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas medianas, alargadas.
- Capítulos medianos de varios colores. Es necesario eliminar las inflorescencias pasadas para que la planta emita nuevas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



Helianthus autumnale "Rotgold Hibrids" junio-2016

## *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.

Variedad: Mutabile

Familia: Cistaceae

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata extendida, cubresuelos.  
Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas pequeñas, alargadas.
- Flores pequeñas abundantes. Tonos rojos y rosas. Florece a principios de verano.  
Hay que podar después de la floración.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



Mayo-2003

## ***Hertia cheirifolia* (L.) Kuntze**

Familia: *Compositae*

**Origen:** norte de África.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores.
- Mata extendida, cubresuelos, colgante. Altura: 20 cm. con flor.
- Hojas medianas, glaucas, espatuladas, muy ornamentales.
- Capítulos pequeños amarillos a finales del invierno y principios de primavera. Deben eliminarse los capítulos pasados, para mantener un aspecto limpio.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



7-marzo-2017



4-diciembre-2017

## *Hemerocallis fulva* (L.) L.

Familia: *Xanthorrhoeaceae*

**Origen:** China, Japón.

**Cultivo:** semilla, división de matas.

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Vivaz de larga duración. Sistema radical potente.
- Mata con hojas basales, densa. Una vez instalada no permite el crecimiento de malas hierbas. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-9.
- Hojas grandes, alargadas.
- Inflorescencias con flores grandes, fugaces. Floración a finales de primavera, principios de verano. Hay que eliminar las inflorescencias pasadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



19-abril-2019



6-junio-2019

## *Hemerocallis x hybrida*

Familia: *Xanthorrhoeaceae*

Variedades: Rajah, Chicago

**Cultivo:** división de matas. Ramets. Cultivo in vitro.

### **Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno (hay algunas variedades semipermanentes). Soporta bien los fuertes calores. Sistema radical potente.
- Mata con hojas basales, densa. Una vez instalada dificulta en gran medida el crecimiento de malas hierbas.
- Zonas climáticas: 3-9.
- Hojas grandes, alargadas, verdes.
- Flores de muchos colores y formas. Cada flor dura un día, pero abren continuamente nuevas flores.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



Rajah 28-junio-2017



Chicago Apache 18-julio-2016



## ***Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L.Burtt**

Variedad: Argentea

Familia: *Compositae*

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 20-marzo-2011.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores. Se utiliza frecuentemente como planta de temporada. Soporta heladas débiles.
- Mata tapizante, colgante. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Hojas pequeñas, ovaladas, grises, muy ornamentales.
- Flores interesantes en otoño.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011



11-mayo-2011



16-junio-2011



8-julio-2011



12-agosto-2011



20-septiembre-2011

## *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don

Familia: *Compositae*

**Origen:** Mediterráneo.

**Cultivo:** semilla, esqueje.

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-10
- Hojas pequeñas, alargadas, grisáceas. Muy ornamental.
- Porte compacto, ornamental.
- Inflorescencias terminales amarillo claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



4-diciembre-2017



6-julio-2019

## *Heuchera x hybrida*

Familia: *Saxifragaceae*

Variedad: Blackout

**Cultivo:** división de matas. Cultivo in vitro.


**Plantación:** 1-mayo-2010.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata almohadillada, densa. Altura: 20 cm.
- Hojas medianas, palmatilobuladas, de color rojo oscuro. Principal valor ornamental.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Floración en primavera: interesante, pero secundaria.

**Plagas/enfermedades:** *Otiorrhynchus sp.*, el segundo año. Ataques de cochinillas algodonosas, cuando se plantan a pleno sol en verano.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



23-junio-2010

20-julio-2010

4-agosto-2010

28-agosto-2010

15-septiembre-2010

20-octubre-2010

## *Heuchera x hybrida*

Variedad: Regina

Familia: *Saxifragaceae*

**Cultivo:** división de matas. Cultivo in vitro.

**Plantación:** otoño-2010.

### Características:

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata almohadillada, densa. Altura: 20 cm.
- Hojas medianas, palmatilobuladas, de color rojo. Principal valor ornamental.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Floración en primavera: interesante, pero secundaria.

**Plagas/enfermedades:** *Otiorrhynchus sp.*, el segundo año. Ataques de cochinilla algodonosa, cuando se plantan a pleno sol en verano.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011

18-abril-2011

11-mayo-2011

30-mayo-2011

16-junio-2011

8-julio-2011

## *Heuchera x hybrida*

Variedad: Creme Brûlée

Familia: *Saxifragaceae*

**Cultivo:** división de matas. Cultivo in vitro.

**Plantación:** otoño-2010.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata almohadillada, densa. Altura: 20 cm.
- Hojas medianas, palmatilobuladas, de color amarillo anaranjado. Principal valor ornamental.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Floración en primavera. interesante, pero secundaria.

**Plagas/enfermedades:** *Otiorrhynchus sp.*, el segundo año.

Ataques de cochinillas algodonosas, cuando se plantan a pleno sol en verano.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



16-junio-2011



8-julio-2011

## Heuchera x hybrida

Variedad: Georgia Peach

**Cultivo:** plantel de esqueje.


**Plantación:** otoño-2017.

### Características:

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata almohadillada, densa. Crecimiento medio. Porte compacto. Altura: 25 cm.
- Hojas palmatilobuladas, rojo claro con venas de tono más intenso. Gran efecto ornamental.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Flores muy pequeñas sobre pedúnculos alargados: interesante pero secundaria

**Plagas/enfermedades:** *Otiorrhynchus sp.*, diversos tipos de cochinillas.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019



2-abril-2018

18-mayo-2018

4-junio-2018

18-junio-2018

17-julio-2018

20-julio-2018

3-agosto-2018

## *Heuchera x hybrida*

Plantación en pirámides.

27-septiembre-2018



25-junio-2010



## *Heuchera x hybrida*

Plantación  
en jardinera  
tipo “sifu”





## ***Hibiscus moscheutos* L.**

Familia: *Malvaceae*

Variedad: Luna

**Origen:** este de Estados Unidos.

**Plantación:** mayo-2014.

**Cultivo:** semilla. **Obtentor:** PanAmerican.

### **Características:**

- Vivaz sensible al frío. La parte aérea desaparece en invierno y rebrota la siguiente primavera. Vivaz de larga duración.
- Mata arbustiva. Altura: 60 cm.
- Zonas climáticas: 5-9
- Flores muy grandes rosas o rojas. Floración muy profusa en junio y julio, escasa en agosto y septiembre. Hay que eliminar las flores secas.
- Hojas grandes, acorazonadas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo



15-junio-2018



15-julio-2018

## ***Helleborus orientalis* Lam.**

Familia: *Ranunculaceae*

**Origen:** Grecia, Asia menor.

**Cultivo:** división de matas.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata extendida. Altura: 35 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Flores sencillas, rosas, grandes. Florece en pleno invierno hasta primavera.
- Hojas grandes digitadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



febrero-2018



junio-2017

## *Hosta x fortunei*

Variedad: Twilight

Familia: *Asparagaceae*

**Origen:**

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores a la sombra.
- Roseta basal. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8
- Hojas grandes verdes con márgenes dorados. Muy ornamentales
- Flores blancas muy ornamentales, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



Junio-2019

## ***Houttuynia cordata* Thunb.**

Variedad: Camaleon

Familia: *Saururaceae*

**Origen:** este de Asia.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores a la sombra. Tolera suelos encharcados. Usos culinarios y medicinales. Planta rizomatosa que puede llegar a ser invasora.
- Mata tapizante, cubresuelos, rizomatosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas 3-8
- Hojas medianas, acorazonadas, variegadas, con tonalidades blancas y rojas. Tiende a mutar a la forma verde. Interés ornamental principal.
- Flores blancas, sencillas, en primavera. Interesantes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



6-julio-2015

## ***Hypericum olympicum* L.**

Variedad:

Familia: Hypericaceae

**Origen:** sureste de Europa, Asia menor.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz. La parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata almohadada, compacta.  
Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Flores amarillas, sencillas, medianas, en cimas terminales.
- Hojas pequeñas, ovaladas, verde grisáceo.  
Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



7-mayo-2015

## ***Ismene x deflexa* Herb.**

Sinónimo: *Hymenocallis x festalis*

Familia: *Amaryllidaceae*

**Cultivo:** bulbo.


### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Flores blancas grandes, en inflorescencias terminales.
- Hojas alargadas, grandes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



## *Iberis sempervirens* L.

Variedad: Schnéeflocke

Familia: Brassicaceae

**Origen:** sur de Europa.

**Cultivo:** semilla.


**Plantación:** octubre-2007.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata almohadillada, compacta. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Flores blancas muy numerosas en primavera.
- Hojas alargadas pequeñas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



27-diciembre-2007



27-febrero-2008



28-marzo-2008



27-junio-2008



14-noviembre-2008



20-marzo-2009

## *Iris domestica* (L.) Goldblatt & Mabb.

**Sinónimo:** *Belamcanda chinensis*

**Familia:** Iridaceae

**Cultivo:** plantel.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.  
Rizomatosa.
- Mata erizada. Altura: 25cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Flores sencillas, amarillas con puntos rojos.  
Floración a principios del verano.
- Hojas medianas alargadas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



10-julio-2019



## *Iris foetidissima* L.

Variegata

Familia: Iridaceae

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanente en invierno. Rizomatosa.
- Mata erizada. Altura: 50 cm.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Hojas verdes, grandes, alargadas.
- Flores azul claro-amarillo claro en verano.
- Frutos abiertos con semillas encarnadas, muy ornamentales, en otoño.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



11-mayo-2016



2-junio-2016



5-julio-2016



31-octubre-2016

## *Iris pallida* Lam.

Variegata

Familia: Iridaceae

**Cultivo:** rizomas.

**Plantación:** otoño-2016.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. Rizomatosa. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata erizada. Altura: 35 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Hojas grandes alargadas, verde glauco con bandas amarillas. Muy ornamentales.
- Inflorescencias con flores azul claro en primavera. Muy ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



15-marzo-2018



11-mayo-2018

11-mayo-2018

## ***Iris x hollandica***

Familia: *Iridaceae*

**Cultivo:** bulbos.

**Plantación:** otoño-2016.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. Parte aérea caduca en verano. Bulbosa.
- Mata erizada. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Flores azules (muchos colores) terminales en primavera.
- Hojas alargadas, verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



## *Iris pseudacorus* L.

Familia: *Iridaceae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Rizomatosa. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Planta acuática. Vive zonas encharcadas y también en suelos húmedos.
- Mata erizada. Altura: 125 cm. con flor.
- Zonas climáticas 5-9.
- Flores amarillas en inflorescencias terminales en primavera.
- Hojas grandes, alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



11-mayo-2018



## *Iris x germánica* L.

Familia: *Iridaceae*

### *Selección de variedades de Estufas*

**Origen:** complejo de híbridos de especies europeas.

**Cultivo:** división de matas.



#### **Características:**

- Vivaz, permanente y semipermanente en invierno. Soporta bien los fuertes calores. Rizomatosa
- Clasificación por alturas.
- Mata erizada. Altura: 30-80 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-10.
- Flores grandes en inflorescencias terminales. Floración más o menos temprana, en primavera.
- Hojas medianas, alargadas, verde glauco. En las variedades seleccionadas permanecen en invierno. Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



## *Iris japonica* Thunb.

Familia: *Iridaceae*

**Origen:** China y Japón.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Rizomatosa.
- Mata erizada. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-10.
- Hojas medianas, alargadas. Tienden a deteriorarse.
- Inflorescencias terminales con flores pequeñas, blancas con manchas azules y amarillas. Florece en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



Primavera-2019

## ***Iris setosa***

Familia: *Iridaceae*

**Origen:** zonas nórdicas de Europa, Asia y América.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2016.

### **Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. Soporta suelos en relativamente bien los fuertes calores. Soporta suelos encharcados.
- Mata erizada. Altura: 80 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Inflorescencias con flores medianas, azules, con manchas amarillas. Florece en primavera.
- Hojas verdes medianas alargadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



11-mayo-2018

## *Iris unguicularis* Poir.

Variegata

Familia: Iridaceae

**Origen:** Grecia, Turquía, Siria, Argelia, Túnez.

**Cultivo:** división de matas.

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 35 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Hojas grandes, verdes, alargadas.
- Flores azules con manchas blanca y amarilla, debajo de las hojas, en invierno.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



27-diciembre-2016



21-febrero-2017



## ***Koeleria glauca* (Spreng.) DC.**

Variedad: Coolio

Familia: *Poaceae*

**Origen:** Europa, Asia.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2005.

### **Características:**

- Vivaz, permanente en invierno. Soporta bien los fuertes calores.
- Mata erizada. Altura: 35 cm. con espigas.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas medianas, estrechas, alargadas, verde glauco.
- Ornamentales.
- Espigas amarillas a partir de abril. Ornamentales. Pueden recortarse en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



1-diciembre-2005



26-marzo-2006



26-abril-2006



25-mayo-2006

## ***Lamium galeobdolon* (L.) L.**

Variedad: Hermann Pride

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Europa, Oeste de Asia.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** abril-2005.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Menos resistente que la especie tipo. Prospera mejor en zonas sombreadas.
- Mata rastrera, tapizante. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas pequeñas, puntiagudas, con una retícula de nervios sobre el fondo blanco: muy ornamentales.
- Flores amarillas, pequeñas, de importancia secundaria.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2005



4-junio-2005



24-junio-2005



28-julio-2005



24-agosto-2006

## ***Lamium galeobdolon* (L.) L.**

Familia: *Lamiaceae*

Variedad: Variegatum

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** abril-2016.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Bastante resistente a pleno sol. Adecuado para zonas sombreadas. Vivaz de larga duración.
- Mata rastrera, tapizante. Vigorosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, con una variegación plateada y nervio principal y márgenes verdes. Muy ornamentales.
- Flores amarillas en primavera.

**Plagas/enfermedades:** pulgones ocasionalmente.

**Orientación:** pleno sol-media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



18-abril-2018



## *Lamium maculatum* (L.) L.

Variedad: Beacon Silver

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2007.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Aguanta a pleno sol, pero prospera mejor a media sombra. Después de dos o tres años hay que renovarla.
- Mata rastrera, tapizante, compacta. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas acorazonadas, plateadas con margen verdoso. Principal valor ornamental.
- Flores rosas en verano.

**Plagas/enfermedades:** cochinilla algodonosa, después de veranos calurosos.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2007

4-junio-2007

24-junio-2007

24-julio-2007

24-agosto-2007

28-diciembre-2007

## *Lamium maculatum* (L.) L

Familia: *Lamiaceae*

Variedad: Roseum

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Aguanta a pleno sol, pero prospera mejor a media sombra.
- Mata rastrera, tapizante. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas acorazonadas, verdes con franja plateada en el centro. En invierno las hojas toman coloraciones rojizas.
- Flores rosas en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



7-mayo-2015



## ***Lathyrus latifolius* L.**

Familia: *Leguminosae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla (florece el segundo año).

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Vivaz de larga duración.
- Trepadora. Altura: 50-200 cm. con flor, sobre un soporte. También se extiende en el suelo, con una altura de 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Flores pequeñas, rosas (hay muchos colores), papilionáceas. Flores en inflorescencias terminales. Hay que eliminar las legumbres secas.
- Hojas medianas, alargadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



Abril-2003

## ***Silene coronaria* (Desr.) Clairv. ex Rchb.**

Sinónimo: *Lychnis coronaria*

Familia: *Cariophyllaceae*

**Origen:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Roseta basal. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, blancas. Muy ornamentales.
- Inflorescencias de flores rosas dispersas en julio-agosto.  
Hay que cortarlas cuando se pasan. Tallos florales blancos.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



1-abril-2011

18-abril-2011

11-mayo-2011

30-mayo-2011

6-junio-2011

16-julio-2011

## *Lavandula pinnata* Lundmark

Familia: *Labiatae*

**Origen:** Canarias.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2005.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Le afectan las heladas. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: 80 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Hojas pequeñas, finamente divididas, verde grisáceo. Planta aromática. Ornamentales.
- Inflorescencias ramificadas, con flores azules, dispersas. Hay que recortarlas para favorecer la emisión de nuevas inflorescencias.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio.



5-mayo-2005

27-mayo-2005

14-junio-2005

22-julio-2005

18-agosto-2005

14-octubre-2005



## ***Lavandula angustifolia* Mill.**

Variedad: Ellagance Sky

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2009.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: 40 cm. con flor.
- Espigas de flores azules en primavera. Deben suprimirse cuando se pasan.
- Hojas pequeñas, alargadas, verde glauco, aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio-alto.



21-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009

## ***Leucophyta brownii* Cass.**

Sinónimo: *Calocephalus brownii*

Familia: *Compositae*

**Origen:** Australia.

**Cultivo:** esqueje, semilla.

**Plantación:** octubre-2018.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Le afectan las heladas. Utilizada en mosaicultura.
- Mata arbustiva, compacta. Altura: 20- 30 cm. Altura: 50-100 cm. con flor en pleno desarrollo.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Hojas y tallos plateados, muy pequeños. Ramificación densa.
- Flores amarillo-blanco en verano, en cabezuelas de 1 cm. No aparecen el primer año a partir de semilla.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019

## ***Lewisia cotyledon* (S. Watson) B.L. Rob.**

Familia: *Montiaceae*

**Origen:** oeste de Estados Unidos.


### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. No soporta el encharcamiento.
- Roseta basal. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Hojas medianas, carnosas, alargadas.
- Inflorescencias en cabezuelas con flores rosa salmón (rosa, amarillo, blanco).

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



mayo-2019

## ***Leymus arenarius* (L.) Hochst.**

Familia: *Poaceae*

**Origen:** costas del centro y norte de Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2014.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Vivaz de larga duración.
- Mata erizada. Altura: 100 cm. con inflorescencias.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Hojas grandes, alargadas, estrechas, verde glauco. Muy ornamentales.
- Espigas alargadas, amarillo claro, en verano. Permanecen en la planta hasta el invierno. Se deben suprimir antes de la nueva floración.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



9-julio-2015

## *Lilium philippinense* Baker

Familia: Liliaceae

**Origen:** Asia de Taiwan a Filipinas.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-mayo-2018.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Órganos de reserva subterráneo: bulbos.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Inflorescencias con flores grandes, blancas. Tallos muy fuertes, no necesita entutorado. Floración limpia. Es necesario eliminar los frutos.
- Hojas medianas, alargadas, estrechas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



1-agosto-2019



4-junio-2018

4-julio-2018

3-agosto-2018

16-agosto-2018



7-agosto-2018

4-junio-2018

3-octubre-2018

28-diciembre-2018

## *Liriope muscari* (Decne.)

L.H.Bailey

Familia: *Asparagaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Aguanta a pleno sol, pero prospera mejor a media sombra. Planta rizomatosa.
- Mata con hojas basales, cubresuelos. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Hojas medianas, alargadas, estrechas, verdes. También verdes con dos franjas plateadas.
- Inflorescencias azules en primavera-verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Agosto-2019



19-abril-2019

## *Glandora diffusa* (Lag.) D.C.Thomas

Sinónimo: *Lithodora diffusa* (Lag.) I.M.Johnst.

Variedad: Heavenly Blue

Familia: *Boraginaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 20-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz, permanente en invierno. No resiste bien los calores de pleno verano. Plantar a media sombra.
- Mata extendida, colgante. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 5-7.
- Hojas pequeñas, alargadas, verdes.
- Flores azules, pequeñas, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



1-abril-2011

18-abril-2011

11-mayo-2011

30-mayo-2011

16-junio-2011

8-junio-2011

## ***Lobelia speciosa* Sweet**

Variedad: Fan Scarlet

Familia: *Campanulaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2011.

**Características:**

- Vivaz, semi-permanente en invierno. Puede utilizarse como acuática.
  - Mata vestida, esbelta. Altura: 60 cm. con flor.
  - Zonas climáticas: 6-8.
  - Espigas con flores rojas en verano. Deben suprimirse cuando se pasan. Es posible una segunda floración.
  - Hojas medianas, alargadas, verdes con márgenes rojizos.
- Ornamentales. Hay variedades con las hojas rojas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra. **Mantenimiento:** medio.



11-mayo-2011



3-junio-2011



16-junio-2011



7-julio-2011



## ***Luzula nivea* (Nathh.) DC.**

**Variedad:** *Lucius*

**Familia:**

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.  
Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata erizada, cubresuelos.  
Altura: 35 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, alargadas, estrechas. Con pelos grises.
- Inflorescencias terminales con flores blancas en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



## ***Silene chalcedonica* (L.) E.H.L.Krause**

Sinónimo: *Lychnis chalcedonica* L.

Familia: *Caryophyllaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 20-marzo-2011.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanente en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Inflorescencias en cabezuelas rojas. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas medianas, alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio.



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



16-junio-2011



8-julio-2011

## *Lysimachia punctata* L.

Variedad: Alexander

Familia: Primulaceae

**Cultivo:** esqueje, división de matas.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Inflorescencias con flores amarillas en julio-agosto. Hay que cortarlas cuando se pasan.
- Hojas medianas, alargadas, lanceoladas, verdes con bordes blancos. Muy ornamentales.



3-junio-2015

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.

## ***Lysimanchia nummularia* L.**

Variedad: Aurea

Familia: *Primulaceae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2003.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Resiste a pleno sol, pero es más conveniente a media sombra.
- Mata rastrera, tapizante, colgante. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas pequeñas, redondeadas, doradas: muy ornamentales.
- Flores amarillas, pequeñas, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2004

24-mayo-2005

24-agosto-2005

diciembre-2005

29-marzo-2006

26-abril-2006

## *Lysimanchia nummularia* L.

Familia: *Primulaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2008.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en invierno. Resiste a pleno sol, pero es más conveniente a media sombra.
- Mata extendida, tapizante, colgante. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas pequeñas, redondeadas, verdes. Ornamentales.
- Flores amarillas, pequeñas, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



5-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



10-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Lythrum salicaria* L.**

Variedad: Swirl

Familia: *Lythraceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 15-abril-2005.

### **Características:**

- Vivaz, no permanente en invierno. Propia de zonas encharcadas.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 30 cm. con flor.
- Inflorescencias tipo espiga, con flores de color rosa. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas medianas, ovaladas, puntiagudas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2005



4-junio-2005



24-junio-2005



28-julio-2005



6-diciembre-2005

## ***Matthiola incana* (L.) R.Br.**

Variedad: Pillow Tank

Familia: Brassicaceae

**Origen:** semilla.

**Plantación:** otoño-2009.


**Características:**

- Bianual o Vivaz de corta duración. Permanece en invierno.
- Mata globosa, compacta. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-8.
- Inflorescencias blancas en primavera.
- Hojas medianas, alargadas, blanquecinas, con interés ornamental.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



4-mayo-2009



21-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Mazus reptans* N.E. Br.**

Familia: Phrymaceae

**Origen:** Himalaya.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 25-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta zonas encharcadas.
- Mata rastrera, tapizante, compacta. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Hojas muy pequeñas, verde claro.
- Flores pequeñas, azules en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



1-Abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



3-junio-2011



16-junio-2011



## *Marrubium supinum* L.

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Mediterráneo.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. En primavera tiende a brotar de la base.
- Mata extendida, semicolgante. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Hojas blanquecinas, tomentosas muy ornamentales.
- Inflorescencias esféricas, con flores malva, sobre tallos alargados. Florece en primavera.
- Frutos esféricos blanquecinos.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



24-marzo-2015



7-mayo-2015



2-junio-2015

## ***Melianthus major* L.**

Familia: *Melianthaceae*

Planta originaria de Sudáfrica

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** mayo-2016.

**Características:**

- Arbusto perennifolio con porte extendido de gran elegancia. Altura: 180-300 cm. Se puede podar.
- Zonas climáticas: 7-11.
- Hojas perennes, compuestas pinnadas, con foliolos de bordes aserrados, muy ornamentales, que adquieren tonos rojizos en invierno.
- Inflorescencias de color rojo oscuro de aspecto muy original.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



5-abril-2018



30-abril-2018



30-abril-2018 (detalle)

## ***Clinopodium thymifolium* (Scop.) Kuntze**

Sinónimo *Micromeria thymifolia*

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Italia, Balcanes, Hungría.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** mayo-2017.

**Características:**

- Vivaz perennifolia.
- Mata arbustiva. Altura: 25 cm. con flores
- Zonas climáticas: 5-8.
- Inflorescencias blancas, con flores muy pequeñas. Floración durante todo el verano.
- Hojas muy pequeñas. Aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



2-junio-2017

3-julio-2017

3-agosto-2017

1-septiembre-2017

17-septiembre-2017

3-octubre-2017

## *Miscanthus sinensis* Andersson

Familia: *Poaceae*

4-diciembre-2017

**Origen:** este de Asia.

**Cultivo:** división de matas.


### Características:

- Gramínea vivaz, no permanece en invierno. Muy resistente a las altas temperaturas. Mata muy densa, no permite el desarrollo de malas hierbas agresivas, como la grama. Muchas variedades.
- Mata erizada, densa. Altura: 2 m. con inflorescencias.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Floración espectacular, con espigas de blancas, en otoño.
- Hojas alargadas, caducas. Las hojas y tallos adquieren un colorido amarillento en diciembre muy ornamental. Debe cortarse a principios de febrero.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



19-abril-2019



1-agosto-2017



23-noviembre-2017

***Miscanthus floridulus* (Labill.)  
Warb. ex K.Schum. & Lauterb**  
Familia: *Poaceae*

**Origen:** este de Asia.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Gramínea vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Muy resistente a las altas temperaturas. Mata muy densa, no permite el desarrollo de malas hierbas agresivas, como la grama.
- Mata erizada, densa. Altura: 3,5 m.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Floración espectacular, con espigas de blancas, en otoño.
- Hojas grandes, alargadas, caducas. Las hojas y tallos adquieren un colorido amarillento en diciembre muy ornamental. Debe cortarse a finales de febrero.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



4-septiembre  
2017



4-diciembre  
2017

## ***Monarda didyma* L.**

Familia: Lamiaceae

Variedad: Panorama (mezcla)

**Origen:** este de Norteamérica.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 25-marzo-2011.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, verdes.
- Inflorescencias con flores en tonos rosas en primavera.  
Deben suprimirse cuando se pasan.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



1-Abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



3-junio-2011



1-julio-2011

## ***Muhlenbergia capillaris* (Lam.) Trin.**

Familia: *Poaceae*

**Origen:** sudeste de Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Gramínea vivaz, semipermanente en invierno. Muy resistente a las altas temperaturas.
- Mata erizada, densa. Altura: con inflorescencias 90 cm.
- Zonas climáticas: 6-10.
- Floración espectacular, con espigas de color rosa, en otoño.
- Hojas muy finas, alargadas, verde claro. La parte aérea adquiere un colorido amarillento en diciembre muy ornamental. Debe cortarse en febrero.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



29-marzo-2017

19-junio-2017

27-julio-2017

22-agosto-2017

27-octubre-2017

20-diciembre-2017

15-febrero-2018

## ***Leopoldia comosa* (L.) Parl.**

Sinónimo: *Muscari comosum*

Familia: *Asparagaceae*

**Origen:** Europa, Asia.

**Cultivo:** Bulbos.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Bulbosa.
- Reposo en pleno verano. Rebrotan en invierno y primavera.
- Mata erizada, bulbosa. Altura: 10 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-6.
- Hojas medianas, finas, alargadas.
- Inflorescencias en panículas con flores azules.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Alameda de Osuna  
Abril-2007



## Género *Narcissus*

Familia: *Amaryllidaceae*

**Cultivo:** bulbos.

**Clasificación de narcisos ornamentales:** 12 clases.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en verano. Necesita pasar un período frío. Clasificación de narcisos ornamentales: 12 clases. La mayoría de las variedades de narcisos se comportan bien como vivaces. Planta bulbosa.
- Mata erizada. Altura: entre 10 y 50 cm., según variedades.
- Zonas climáticas variables, entre 4-9.
- Hojas medianas, alargadas, de muy diversos tamaños.
- Flores sencillas o dobles, de muy diversos tamaños y formas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Alameda de Osuna marzo-2007

***Nepeta racemosa* Lam.**  
*Nepeta × faassenii* Bergma  
ns ex Stearn  
Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.
  - Mata compacta. Altura: con flor 40 cm.
  - Zonas climáticas: 3-8.
  - Inflorescencias con flores pequeñas, azules, en primavera y verano.
  - Hojas pequeñas ovaladas, glaucas. Ornamentales
- Plagas/enfermedades:** cicadelas.  
**Orientación:** pleno sol-media sombra.  
**Mantenimiento:** medio-bajo.



31-mayo-2018



marzo-2018



## ***Oenothera macrocarpa* Nutt.**

Sinónimo: *Oenothera missouriensis*

Familia: *Onagraceae*.

**Origen:** centro sur de Estados Unidos.

**Plantación:** otoño-2010.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.  
Suelos drenados.
- Mata rastrera. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas, alargadas, verdes.
- Flores grandes, sencillas, amarillas, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



1-Abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



16-junio-2011

## ***Oenothera fruticosa* L.**

Variedad: African Sun

Familia: *Onagraceae*.

**Origen:** este de Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata rastrera, colgante. Altura: 30 cm.
- Inflorescencias con flores medianas, sencillas, amarillas, en primavera y verano.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Inflorescencias con flores medianas, sencillas, amarillas, en primavera y verano.
- Hojas alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



22-junio-2006



## ***Oenothera speciosa* Nutt.**

Familia: *Onagraceae*

**Origen:** este de Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Vivaz de larga duración.
- Mata rastrera, colgante, estolonífera. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas: 5-8.
- Flores medianas, sencillas, blancas que tornan al rosa pálido. Florece en verano.
- Hojas alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo-medio.

15-junio-2018



## ***Origanum majorana* L.**

Variedad: Venecia

Familia: *Lamiacea*

**Origen:** India, Mediterráneo,  
Norte de África.

**Plantación:** mayo-2017.

### **Características:**

- Vivaz perennifolia.
- Mata extendida.  
Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Hojas verde-gris,  
aromáticas.  
Ornamentales.
- Floración a finales de  
primavera: las  
inflorescencias presentan  
un aspecto muy parecido  
a las hojas y ramas.

**Plagas/enfermedades:** no se  
han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017



15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017



5 agosto-2017



17-agosto-2017



1-septiembre-2017



17-septiembre-2017



3-octubre-2017

## ***Origanum vulgare* L.**

Variedad: Compactum

Familia: *Lamiaceae*

**Plantación:** mayo-2017

### **Características:**

- Vivaz perennifolia. Suelos drenados.
- Mata extendida, compacta. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Inflorescencias con flores pequeñas, blancas con sépalos rojizos. Florece durante todo el verano.
- Hojas ovaladas, verdes, pequeñas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017



15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017



3-agosto-2017



17-agosto-2017



1-septiembre-2017



18-septiembre-2017



3-octubre-2017

## ***Origanum dictamnus* L.**

Variedad: Compactum

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2010.

**Características:**

- Vivaz perennifolia. Suelos drenados. Vivaz de larga duración.
- Mata extendida, colgante. Altura: 15 cm. con flor.
- Hojas ovaladas, tomentosas, blanquecinas, muy ornamentales. Aromáticas.
- Inflorescencias pequeñas, colgantes con brácteas verdosa. Hay que eliminarlas en otoño.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



24-mayo-2010



23-junio-2010



16-julio-2010



4-agosto-2010



28-agosto-2010



15-septiembre-2010



20-octubre-2010



## *Origanum x rotundifolia*

Variedad: Kirigami

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 10-mayo-2019.


**Características:**

- Vivaz perennifolia. Suelos drenados.
- Mata extendida, colgante.  
Altura: 20 cm. con flor.
- Hojas ovaladas, grandes, verdosas
- Inflorescencias grandes, colgantes con brácteas verde-rosa.


**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



14-mayo-2019



3-junio-2019



1-julio-2019



5-agosto-2019



5-septiembre-2019

***Oxalis triangularis* subsp.  
*papilionacea* (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig**  
Familia: *Oxalidaceae*

**Origen:** Brasil.

**Plantación:** otoño-2008.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Planta bulbosa.
- Mata con hojas basales.  
Altura: con flor 25 cm.
- Zonas climáticas: 8-9.
- Hojas con tres folíolos triangulares, púrpura. Muy ornamentales.
- Flores blancas, interesantes, en verano y otoño.

**Plagas/enfermedades:** roya.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo-medio.



4-mayo-2009



21-mayo-2009



11-junio-2009



2-agosto-2009



10-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

***Oxalis triangularis* subsp. *papilionacea***  
**(Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig**  
Familia: *Oxalidaceae*



## *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

Variedad: Akila F1 White Daisy

**Origen:** Sudáfrica.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Vivaz subtropical, de hojas persistentes. Sensible a las heladas. Rebrotan en primavera. Se autosiembra y ello contribuye a la pérdida de la variedad.
- Mata arbustiva. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas (8)-9-10.
- Interesante floración en otoño e invierno. A final del invierno florece profusamente. En verano la floración decae y resurge en otoño con el fresco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** protegida, pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



18-nov-2016

30-enero-2017

29-marzo-2017

20-junio-2017



22-agosto-2017



27-October-2017



20-diciembre-2017



13-marzo-2018



17-mayo-2018



26-junio-2018



20-septiembre-2018



19-marzo-2019

***Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.**  
Serie Akila F1



Akila Purple



Akila Daisy White



Akila Lavender Shades



Akila Purple Eye



Akila White

## ***Panicum virgatum* L.**

Familia: *Poaceae*

Variedades.

**Origen:** Norteamérica.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Vivaz de larga duración. Dividir cada 3-4 años.
- Mata erizada. Altura: 100 cm. con inflorescencias.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Espigas en verano. La planta con espigas se mantiene en invierno seca, por su valor ornamental. Se cortan a finales de febrero. Tiende a autosembrarse: puede ser bastante invasora y además se pierde la variedad.
- Hojas grandes, estrechas y alargadas, verde glauco.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



Agosto-2019

## *Pelargonium x hybrida*

Variedades del grupo Scented Leaved antiguas

Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas, debe plantarse en zonas protegidas. No podar en invierno para proteger la planta del frío.
- Grupo de *Pelargonium* obtenido en Inglaterra en el s. XIX. Variedades aromáticas.
- Mata arbustiva, más o menos extendida. Altura: con flor 40-80 cm.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Hojas de muchos tamaños y colores. Aromáticas. Ornamentales.
- Flores de varios colores y formas. La floración principal es en primavera, repitiéndose ocasionalmente en otoño.

**Plagas/enfermedades:** Pulgones. Poco sensibles a *Cacyreus marshallii*.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



Sweet Mimosa 5-junio-2019



Royal Oak 5-junio-2019



Orsett 8-julio-2011



Lady Plymouth 8-julio-2011



Pink Capricorn 8-julio-2011

## *Pelargonium x hybrida*

Variedades antiguas del grupo Angel  
Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas, debe plantarse en zonas protegidas. No podar en invierno para proteger la planta del frío.
- Grupo de *Pelargonium* obtenido en Inglaterra en el s. XIX. Variedades aromáticas.
- Mata arbustiva, semicolgante.  
Altura: con flor 40-80 cm.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Flores de varios colores y formas, con manchas más oscuras. La floración principal es en primavera, repitiéndose ocasionalmente en otoño.  
Plantas parecidas a las del grupo Regal pero en pequeño.
- Hojas pequeñas, redondeadas, con bordes aserrados. Aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** sensible a *Cacysus marshalli*. Pulgones.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Imperial Butterfly



Roller Echo



Quantock Classic



## *Pelargonium x hybrida*

Variedades antiguas  
del grupo Unique

**Familia:** *Geraniaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas, debe plantarse en zonas protegidas. No podar en invierno para proteger la planta del frío.
- Grupo de *Pelargonium* obtenido en Inglaterra en el s. XIX. Variedades aromáticas.
- Mata arbustiva, más o menos extendida. Altura: con flor 40-80 cm.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Flores grandes de varios colores y formas. La floración principal es en primavera, repitiéndose ocasionalmente en otoño.
- Hojas lobuladas, de muchos tamaños y colores. Aromáticas. Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** Pulgones. Poco sensibles a *Cacysreus marshallii*.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



Patton Unique 5-julio-2019



Patton Unique 8-julio-2011



Crimson Unique 8-julio-2011



Rollinson Unique 8-julio-2011

## ***Pelargonium cordifolium* Curtis**

**Familia:** *Geraniaceae*

**Origen:** Sudáfrica

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta heladas débiles.
- Mata arbustiva. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-9.
- Hojas medianas, acorazonadas.
- Flores pequeñas, rosas. Muy abundantes. Florece en primavera.

**Plagas/enfermedades:** pulgones.

**Orientación:** pleno sol. Zonas protegidas.

**Mantenimiento:** medio.



14-mayo-2018

## *Pelargonium capitatum*(L.) L'Hér.

Familia: Geraniaceae

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** 1-mayo-2008.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas. No podar en invierno para proteger la planta.
- Mata arbustiva. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Inflorescencias en cabezuelas rosa claro. Floración principal en primavera y principios de verano.
- Hojas medianas, lobuladas, aromáticas. Es la malvarrosa.

**Plagas/enfermedades:** pulgones.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



26-mayo-2008



26-junio-2008



10-julio-2008



4-agosto-2008



25-agosto-2008



3-septiembre-2008

## *Pelargonium x fragrans*

Familia: *Geraniaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz sensible al frío, permanece en invierno.
- Mata extendida, colgante. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Flores blancas simples de mayo a octubre.
- Hojas glaucas, perfumadas, lobuladas con incisiones en el borde.

**Plagas y enfermedades:** pulgones.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



14-mayo-2018

## ***Penstemon hartwegii* Benth.**

Variedad: Pasham Laura

Familia: *Polygonaceae*

**Cultivo:** plantel de esqueje.

**Plantación:** 3-mayo-2019.

### **Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.
- Mata globosa. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Inflorescencias terminales con flores tubulares rosa claro con márgenes rosa oscuro, en primavera y verano. Deben suprimirse las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Hojas medianas, alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-alto.



14-mayo-2019



1-julio-2019



15-julio-2019



6-agosto-2019



5-septiembre-2019

## *Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

Familia: *Polygonaceae*

**Cultivo:** esqueje.


**Plantación:** 10-mayo-2015.

**Características:**

- Vivaz sensible al frío, permanece en invierno, sino hace demasiado frío. Rebrotará en primavera. Planta rupícola.
- Mata rastrera, tapizante, colgante. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 7-9.
- Inflorescencias esféricas rosa claro.
- Hojas verdes con manchas rojizas. En otoño-invierno la planta entera se torna rojiza. Muy ornamentales.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



27-mayo-2005



14-junio-2005



7-julio-2005



18-agosto-2005



14-septiembre-2005



14-octubre-2005

## *Petasites fragrans* (Vill.) C.Presl

Familia: *Polygonaceae*

**Cultivo:** división de matas.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.  
Rizomatosa. Invasora sino se controla. Muy resistente a todas las exposiciones.
- Mata rastrera, tapizante.  
Altura: 20cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-9
- Inflorescencias con flores rosas en pleno invierno.
- Hojas medianas, redondeadas, verdes. Ornamentales.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



enero-2018



Parque del Retiro 6-mayo-2019



4-abril-2019

## ***Polemonium yezoense***

Variedad: Purple Rain Strain

Familia: *Polemoniaceae*.

**Origen:** Japón.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: con 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Inflorescencias terminales con flores azules en primavera.
- Hojas compuestas, con foliolos apuntados, verde rojizo en invierno, verde claro en primavera y verano. Hojas y porte ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.

Polemonium yezoense Purple Rain Strain  
19-junio-2019





## ***Polemonium boreale* Adams**

Variedad: Heavenly habit.

Familia: *Polemoniaceae*.

**Origen:** Japón.

**Cultivo:** semilla.


**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta.  
Altura: con 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Inflorescencias terminales con flores azules en primavera. Hay que suprimir las flores pasadas para estimular la emisión de nuevas. Florece en primavera y principios del verano.
- Hojas compuestas, con folíolos apuntados. Hojas y porte ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



24-marzo-2015



7-mayo-2015

## ***Perovskia atriplicifolia* Benth.**

Variedad: Blue Spire

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** abril-2015.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Suelos drenados.
- Mata arbustiva, poco densa. Altura: 100 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas finamente divididas, glaucas. Ornamentales.
- Inflorescencias azules. Flores muy pequeñas, dispersas.
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-alto.



6-junio-2019



28-junio-2019

## *Phalaris arundinacea* L.

Variedad: Picta.

Familia: *Poaceae*

**Cultivo:** división de matas.

**Plantación:** octubre-2009.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.  
Suelos húmedos, encharcados.
- Mata erizada. Altura: 60 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas alargadas, verdes con bandas blancas.  
Muy ornamentales.
- Panículas verdosas en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio.



21-mayo-2009



10-junio-2009



15-junio-2009



5-agosto-2009



26-agosto-2009



14-septiembre-2009

## ***Phlomis fruticosa* L.**

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Mediterráneo.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:**

**Características:**

- Arbusto, las hojas permanecen en invierno.
- Altura: 150 cm. con flor. Debe podarse después de la floración y también periódicamente para controlar la altura.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Inflorescencias con flores amarillas en primavera-verano.
- Hojas medianas, alargadas grises. Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



## ***Phlox paniculata* L.**

Variedad: Europa

Familia: *Polemoniaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2010.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 100 cm.
- Inflorescencias grandes, semiesféricas, con flores rosa claro con ojo más oscuro. Hay que eliminar las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas. Florece en verano.
- Hojas medianas, alargadas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



1-Abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



30-mayo-2011



1-julio-2011

## ***Phlox subulata* L.**

Variedad: Mc. Daniels Cushion

Familia: *Polemoniaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** octubre-2009.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata extendida, densa, cubresuelos. Porte muy ornamental. Altura: 15 cm.
- Flores rosas en primavera. Floración densa.
- Hojas pequeñas, alargadas, finas, verde claro.
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



3-nov-2009

23-dic-2009

5-feb-2010

1-mar-2010

29-mar-2010

28-abr-2010

24-may-2010

## ***Phlox subulata* L.**

Variedad: Candy Stripes

Familia: *Polemoniaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** octubre-2009.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata extendida, densa, cubresuelos. Altura: 15 cm. porte ornamental.
- Zonas climáticas: 2-8.
- Flores blancas con una banda rosa, en primavera. Floración densa.
- Hojas pequeñas, finas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



3-nov-2009

23-dic-2009

5-feb-2010

1-mar-2010

29-mar-2010

28-abr-2010

24-may-2010

## ***Phlox subulata* L.**

Variedad: Purple Beauty

Familia: *Polemoniaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** octubre-2009.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata extendida, densa, cubresuelos.  
Altura: 15 cm. Porte ornamental.
- Zonas climáticas: 2-8.
- Flores malva en primavera. Floración densa.
- Hojas pequeñas, finas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



28-abril-2010



## ***Phormium colensoi* Hook.f.**

Familia: *Xanthorrhoeaceae*

### *Variedades*

**Origen:** Nueva Zelanda.

**Cultivo:** división de matas.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata erizada. Altura: 60 cm.
- Zonas climáticas: 8-9.
- Hojas basales, alargadas, con diversos coloridos. Muy ornamentales.
- Inflorescencias con flores péndulas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



28-abril-2010

## ***Phuopsis stylosa* (Trin.) Hook.f. ex B.D.Jacks.**

Familia: Rubiaceae

**Origen:** Cáucaso, Irán.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2007.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno.  
Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata rastrera, tapizante.  
Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Inflorescencias en pequeñas cabezuelas con flores muy pequeñas de color rosa.
- Hojas pequeñas, estrechas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Diciembre-2007

## ***Phygелиus capensis* E. Mey. ex Benth.**

Familia: *Scrophulariaceae*

**Origen:** Sudáfrica.

**Plantación:** 15-marzo-2011.

**Cultivo:** semilla

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: con 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-10.
- Inflorescencias con flores tubulares rosas, colgantes, en primavera.
- Hojas medianas lanceoladas, verdes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



1-Abril-2011

18-abril-2011

11-mayo-2011

30-mayo-2011

3-junio-2011

16-junio-2011

## *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC.

Familia: Campanulaceae

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2017.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas medianas lanceoladas, verdes.
- Flores grandes, campanuladas, azules, en inflorescencias terminales. Floración corta en primavera Hay que suprimir las flores pasadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



19-junio-2019



## *Prunella grandiflora* (L.) Scholler

Familia: *Lamiaceae*

1ª Plantación: otoño 2016/2ª.

Plantación: otoño-2017.

### Características:

- Planta vivaz. Parte aérea no persistente en invierno.
- Mata rastrera, tapizante.  
Altura: 25 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Flores malvas en espigas.  
Reflorece continuamente en verano. Hay que eliminar las flores pasadas, para estimular la emisión de nuevas.
- Los frutos, de color pardo, tienen cierto interés ornamental pero retrasan la siguiente floración.
- Hojas medianas, ovaladas, verdes.

**Plagas y enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio-alto.



3-oct-2017



19-ene-2018



13-marzo-2018



11-abril-2018



19-mayo-2018



19-junio-2018



17-julio-2018



23-agosto-2018



20-sept-2018



12-nov-2018

## *Pulmonaria saccharata* Mill.

Familia: *Boraginaceae*.

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. Zonas frescas y sombreadas.
- Mata con hojas basales. Altura: 30cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-7.
- Hojas medianas, lanceoladas, verde claro con manchas plateadas. Muy ornamentales.
- Inflorescencias terminales con flores tubulares, blancas o azuladas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** bajo.

7-mayo-2015



30-julio-2019



1-abril-2014

## ***Anemone pulsatilla* L.**

Sinónimo: *Pulsatilla vulgaris*

Familia: *Ranunculaceae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2013.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en invierno. Vivaz de larga duración.
- Mata globosa, densa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-8.
- Flores medianas, sencillas, malva con estambres amarillos, en primavera.
- Frutos ornamentales en verano.
- Hojas medianas, profundamente divididas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



5-julio-2014

## ***Rheum rhabarbarum* L.**

Familia: *Polygonaceae*.

**Origen:** China.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2005.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata con hojas basales. Altura: 120 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 2-9.
- Hojas grandes, con peciolo rojos (comestibles).
- Inflorescencias muy grandes, con flores blanco verdoso, en primavera. Se producen el segundo año después de la siembra.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



25-mayo-2005



9-mayo-2005



24-junio-2005



24-agosto-2005



diciembre-2005



29-marzo-2006



## ***Rohdea japonica* (Thunb.) Roth**

Familia: *Asparagaceae*

**Origen:** China y Japón.

**Cultivo:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata con hojas basales. Altura: 60 cm.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Hojas grandes, alargadas, con márgenes blancos. Ornamentales.
- Flores en la base de la mata, poco significativas

**Plagas/enfermedades:** babosas, *Otiorhynchus sp.*

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



10-julio-2019

## ***Rodgersia aesculifolia* Batalin**

Familia: *Saxifragaceae*.

**Cultivo:** semilla.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Zonas sombreadas, frescas. Planta rizomatosa.
- Mata con hojas basales. Altura: 100 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-6 (8).
- Hojas grandes, verde claro, palmatisectas. Parecidas a las del castaño de indias. Ornamentales.
- Inflorescencias grandes terminales con flores blancas, en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra-sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



19-abril-2019

## ***Rubus tricolor* Focke**

**Variedad: Betty Ashburner**

Familia: *Rosaceae*

**Origen:** esqueje

**Plantación:** abril-2016.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Posible origen híbrido.
- Porte rastrero, cubresuelos, colgante. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 6-8.
- Hojas verdes, medianas, redondeadas, con nerviaciones marcadas. Rojizas en invierno. Ornamentales.
- Flores blancas poco significativas.
- Frutos amarillos no observados.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019

## ***Rudbeckia fulgida* Aiton**

Variedad: Goldsturm

Familia: *Compositae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2004.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno
- Mata globosa. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-9.
- Hojas medianas, verde claro, lanceoladas.
- Capítulos amarillos a principios del verano.  
Reflorece si se cortan las flores pasadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



9-mayo-2005

4-junio-2005

24-junio-2005

28-julio-2005

24-agosto-2005

10-diciembre-2005

## ***Ruellia simplex* C.Wright**

Familia: *Acanthaceae*

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2016.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Larga duración.
- Mata arbustiva. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-9.
- Hojas medianas, verde claro, lanceoladas.
- Flores campanuladas azules en verano. Floración limpia.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



1-agosto-2019



## ***Ruta montana (L.) L.***

Familia: *Rutaceae*

**Origen:** zona mediterránea. Planta autóctona.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** abril-2009.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Suelos drenados.
- Porte globoso, compacto. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Hojas finamente divididas, glaucas. Ornamentales.
- Inflorescencias amarillo verdoso en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



4-mayo-2009

11-junio-2009

2-agosto-2009

10-agosto-2009

26-agosto-2009

14-septiembre-2009

## ***Rumex sanguineus* L.**

Familia: *Polygonaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:**

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Comestible.
- Mata con hojas basales. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 7-9.
- Hojas grandes, lanceoladas, con nerviaciones marcadas en rojo. Colorido más intenso en invierno. Ornamentales.

**Plagas/enfermedades:** oídio en primavera.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



24-marzo-2015



Mayo-2019

## ***Salvia argentea* L.**

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2016.

### **Características:**

- Planta vivaz, semipersistente en invierno. Suelos drenados.
- Rosetas basales. Altura: 65 cm. con flor. Zonas climáticas: 5-8.
- Hojas ovaladas, de gran tamaño y cubiertas de un tomento grisáceo que les confiere un gran valor ornamental. En invierno pierde parte de las hojas, tomando las que permanecen un color casi blanco.
- Inflorescencias interesantes en primavera, aunque se deteriora rápidamente su aspecto y deben suprimirse. Florece el segundo año.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



6-junio-2019



2-junio-2017



15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017




5-agosto-2017



17-agosto-2017



1-septiembre-2017



17-septiembre-2017



3-octubre-2017



## ***Salvia elegans* Vahl**

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Méjico.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2017.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores.
- Mata globosa. Altura: 50cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Inflorescencias con flores pequeñas, tubulares, rojas.
- Hojas medianas, acorazonadas, verde claro con nervios marcados.  
Aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



30-junio-2019



## ***Salvia leucantha* Cav.**

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Méjico.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Planta vivaz, de base leñosa. Sensible a las heladas, pero rebrota de la base. Conviene dejar la parte aérea helada hasta marzo.
- Mata arbustiva. Altura: 120 cm.
- Zonas climáticas: (8)-9.
- Hojas y tallos de color gris, muy ornamentales.
- Inflorescencias con flores blancas y cálices malva durante todo el verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



21-noviembre-2018

## *Salvia sclarea* L.

Variedad: Vatican White

Familia: Lamiaceae

**Plantación:** 15-marzo-2008.

### **Características:**

- Planta vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: 70 cm. con flor.
- Inflorescencias grandes, con brácteas blancas, espectaculares en primavera.
- Hojas acorazonadas, grandes, aromáticas. Ornamentales.
- Se autosiembra con facilidad, lo que lleva a que se pierdan las características de la variedad.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



6-junio-2018



28-marzo-2008



27-junio-2008



21-enero-2009



26-abril-2009



13-junio-2009

## *Salvia pachyphylla* Epling ex Munz

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** zonas áridas de California.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** otoño-2016

**Características:**

- Planta vivaz. Suelos secos, drenados.
- Mata arbustiva. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-10.
- Floración de color malva espectacular.
- Hojas y tallos de color gris, muy ornamentales.

**Plagas/enfermedades:**

no se han observado.

Teme el exceso de agua.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo



junio-2018



2-junio-2017



15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017



5-agosto-2017



17-agosto-2017



1-septiembre-2017



3-octubre-2017

## ***Salvia x sylvestris* L.**

Familia: *Lamiaceae*

Sinónimo: *Salvia x superba*

Variedad: *Amethyst*

**Cultivo:** división de matas.


### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-7.
- Espigas terminales alargadas, con flores pequeñas, malva claro-oscuro. Deben suprimirse las flores pasadas, para estimular la emisión de nuevas. Florece en primavera-verano.
- Hojas medianas, alargadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



## ***Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl***

Familia: *Lamiaceae*

Variedad: Lady in Red

**Origen:** América central.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Sensible a las heladas. Cultivada como planta de temporada.
- Mata arbustiva. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Espigas terminales, con flores pequeñas, rojas. Deben suprimirse las flores pasadas, para estimular la emisión de nuevas. Floración en verano y otoño. En agosto decae y remonta en septiembre.
- Hojas verdes, medianas, acorazonadas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



Parque del Retiro  
11-mayo-2005



## *Saponaria officinalis* L.

Familia: Caryophyllaceae

**Origen:** sur de Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2004.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata extendida, rizomatosa. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 2-8.
- Inflorescencias en cabezuelas blancas.  
Reflorece si se suprimen las pasadas.
- Hojas medianas, verdes, lanceoladas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



9-mayo-2005

4-junio-2005

24-junio-2005

28-julio-2005

24-agosto-2005

10-diciembre-2010

## ***Satureja spicigera* (K.Koch) Boiss.**

Variedad: Creeping Savory Karpaten

Familia: *Lamiaceae*

**Origen:** Irán, Caucaso.

**Cultivo:** plantel.

**Plantación:** mayo-2017.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno
- Mata rastrera, colgante, muy compacta. Porte ornamental. Altura: 15 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Floración en espigas blancas, en septiembre-octubre, muy ornamental.
- Hojas muy pequeñas color verde claro. Aromáticas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo



2-junio-2017

15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017



3-agosto-2017



16-agosto-2017



1-septiembre-2017



18-septiembre-2017



3-octubre-2017



## ***Hylotelephium sp.***

Sinónimo: *Sedum telephium*

Familia: *Crassulaceae*

**Origen:** esqueje.

**Plantación:** otoño-2009.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno
- Mata globosa.  
Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Inflorescencias grandes con flores pequeñas rosas o rojas. Floración en verano. Las flores cambian de tonalidad hasta estar completamente secas. Florecen en verano.
- Hojas medianas, carnosas, ovaladas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.

“Matrona” 5-agosto-2010



“Munstead Dark Red” 5-agosto-2010



“Herbert Freude” 28-agosto-2010

## ***Sedum rubrotinctum* R.T. Clausen**

*Sedum x rubrotinctum*

Familia: *Crassulaceae*.

**Cultivo:** esqueje.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata rastrera, colgante. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 8-10
- Hojas carnosas con tintes rojizos.  
Ornamentales.
- Flores pequeñas en verano.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019

## *Jacobaea maritima* (L.) Pelsers & Meijden

Sinónimo: Senecio bicolor

Variedad: Cirrus

Familia: *Compositae*

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 10-Abril-2014.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata arbustiva. Altura: 30 cm.
- Zonas climáticas: 7-9.
- Hojas con interés ornamental, blancas, aterciopeladas. Planta de mosaicultura.
- Flores amarillas, a partir del segundo año, de interés secundario.

**Plagas/enfermedades:** oídio en cultivo.

**Orientación:** pleno sol **Mantenimiento:** medio-bajo.



13-mayo-2014



23-junio-2014



17-julio-2014



27-agosto-2014



23-septiembre-2014

## *Sisyrinchium striatum* Sm.

Familia: *Iridaceae*

**Origen:** Argentina y Chile.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 25-Abril-2005.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 6-10.
- Hojas con interés ornamental, alargadas, glaucas.
- Flores blancas, a partir del primer año, de interés secundario. Florece en primavera.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** medio.



9-mayo-2005



24-junio-2005



24-agosto-2005



10-diciembre-2005



29-marzo-2006



25-mayo-2006

## *Stachys byzantina* K.Koch

Variedad: Silver Carpet

Familia: Lamiaceae

**Cultivo:** esqueje.

**Plantación:** abril-2015.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Porte rastrero, compacto. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas alargadas, grises, tomentosas.  
Muy ornamentales.
- Inflorescencias escasas en verano. Flores rosas.  
La inflorescencia entera está cubierta de un tomento.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



9-mayo-2015



4-junio-2015



24-junio-2015



28-julio-2015



24-agosto-2015



6-diciembre-2015

## *Stokesia laevis* (Hill) Greene

Familia: Compositae

**Origen:** Estados Unidos.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-mayo-2017.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata extendida. Altura: 30 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-9
- Capítulos grandes azulados. Floración en verano. Hay que suprimir las inflorescencias pasadas para estimular la emisión de nuevas.
- Frutos interesantes.
- Hojas medianas, lanceoladas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017



15-junio-2017



17-julio-2017



16-agosto-2017



16-septiembre-2017

## *Symphytum officinale L.*

Familia: Boraginaceae

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** primavera-2014.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores.
- Mata con hojas basales.  
Altura: 80 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-7.
- Hojas muy grandes, de ovadas a lanceoladas. Con largo peciolo. Ornamentales.
- Inflorescencias con flores pequeñas, color malva. Interesantes.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



6-agosto-2019



6-mayo-2015

## ***Tanacetum vulgare* L.**

**Familia:** *Compositae*

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** mayo-2008

**Características:**

- Vivaz. Planta silvestre. Permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 70 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Hojas finamente divididas, verde claro, muy ornamentales.
- Inflorescencias amarillas en otoño-invierno.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol, media sombra.

**Mantenimiento:** medio-bajo.



27-junio-2008



10-julio-2008



18-agosto-2008



11-noviembre-2008



16-diciembre-2008



21-enero-2009



## ***Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip.**

Sinónimo: *Pyrethrum parthenium*

Variedad: Aureum Mousse.

Familia: *Asteraceae*.

**Origen:** semilla.

**Plantación:** 30-marzo-2011.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata extendida, compacta, cubresuelos. Altura: 20 cm.
- Zonas climáticas: 5-8.
- Hojas finamente divididas. Color amarillo verdoso. Principal característica ornamental. Planta de mosaicultura.
- Floración poco interesante, debe suprimirse.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** medio-bajo.



1-abril-2011



18-abril-2011



11-mayo-2011



3-junio-2011



8-julio-2011



20-agosto-2011

## ***Thalictrum delavayi* Franch.**

Familia: *Ranunculaceae*

**Origen:** división de matas.

**Características:**

- Vivaz, no permanece en invierno.
- Mata vestida, esbelta. Altura: 160 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-7.
- Floración en julio. Inflorescencias grandes, espectaculares, con muchas flores pequeñas, de color malva y blanco. Necesita entutorado.
- Hojas compuestas, pinnadas. Foliolos redondeados con bordes recortados, que recuerdan al culantrillo. Ornamentales.
- **Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



julio-2019

## *Thymus pulegioides*

Variedad: Archer<sup>®</sup> Gold

Familia: Lamiaceae

**Origen:** Europa.

**Cultivo:** esqueje.


**Plantación:** mayo-2017.

**Características:**

- Vivaz, perennifolia.
- Porte tapizante, colgante, compacto. Porte ornamental. Altura: 10cm.
- Zonas climáticas: 4-8.
- Hojas muy pequeñas verde claro con manchas amarillas.
- Inflorescencias con flores muy pequeñas, malva y rosa.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.


**Orientación:** pleno sol. **Mantenimiento:** bajo.



2-junio-2017



15-junio-2017



3-julio-2017



17-julio-2017



5 agosto-2017



17-agosto-2017



1-septiembre-2017



17-septiembre-2017



3-octubre-2017

## ***Thymus vulgaris* L.**

Variedad: Fredo

Familia: *Lamiaceae*

**Cultivo:** plantel de esqueje.

**Plantación:** mayo-2017.

### **Características:**

- Vivaz, perennifolia. Suelos secos, drenados.
- Porte tapizante, compacto, topiario. Muy ornamental.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Hojas muy pequeñas verde claro con manchas amarillas poco aparentes.
- Inflorescencias con flores muy pequeñas

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** bajo.



julio-2018



abril-2018

## ***Tradescantia × andersoniana* W.Ludw. & Rohweder**

Familia: *Campanulaceae*

**Origen:** mediterráneo oriental.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-abril-2014.

**Características:**

- Vivaz de larga duración, no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: 40 cm.
- Zonas climáticas: 4-9
- Flores pequeñas. azules en verano. Fugaces, aunque continuamente abren nuevas.
- Hojas medianas, lanceoladas verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



8-julio-2019

## ***Tulbaghia violacea* Harv.**

Familia: Amaryllidaceae

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Fuerte olor a ajo.
- Mata erizada. Altura: 50 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Flores azules en cabezuelas terminales.
- Hojas medianas, alargadas, verde claro.


**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



Parque del Retiro  
1-agosto-2019



## *Tulipa x hybrida*

Variedades Tulipanes Botánicos: Greigii, Fosteriana, Kaufmanniana.

**Origen:** híbridos.

### **Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en verano. Planta bulbosa.
- Mata con hojas basales. Altura: 20-40 cm.
- Zonas climáticas: 6-9.
- Hojas alargadas verdes, a veces con bandas rojizas. No deben suprimirse después de la floración si se pretende que se comporten como vivaces.
- Flores de muchos tipos y colores, generalmente de poca altura y en muchos casos varias flores por cada bulbo. Deben suprimirse para evitar la producción de semillas.

**Plagas/enfermedades:** pudriciones.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo-medio.



Pinocchio 28-marzo-2000 (Greigii)



Purissima 28-marzo-2000 (Fosteriana)



Cape Cod 28-marzo-2000 (Greigii)

## *Verbena canadensis* *Glandularia canadensis* (L.) Small

Variedad: Purple

Familia: *Verbenaceae*

**Origen:** Norteamérica.

**Plantación:** 15-abril-2007.

### **Características:**

- Vivaz de larga duración, permanece en invierno en zonas templadas.
- Mata rastrera. Altura: 20 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 8-10.
- Floración en primavera, verano y otoño. Inflorescencias color violeta. Si se eliminan las flores pasadas, reflorece.
- Hojas pequeñas, ovadas con borde aserrado, verde claro, rojizas en invierno.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo-medio.



8-mayo-2007

29-junio-2007

19-julio-2007

10-agosto-2007

31-agosto-2007

25-septiembre-2007

15-octubre-2007



## ***Verbena rigida* Spreng.**

Familia: *Verbenaceae*

**Origen:** Brasil, Argentina.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 15-abril-2007.

### **Características:**

- Vivaz, permanece en invierno en zonas templadas.
- Mata extendida. Altura: 40 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-10.
- Floración en primavera, verano y otoño. Inflorescencias color violeta. Si se eliminan las flores pasadas, reflorece.
- Hojas lanceoladas verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



8-mayo-2007

29-junio-2007

19-julio-2007

10-agosto-2007

31-agosto-2007

12-septiembre-2007

25-septiembre-2007

## ***Veronica longifolia* L.**

Familia: *Plantaginaceae*.

Variedades

**Origen:** Norte y centro de Europa y Asia.

**Cultivo:** esqueje.

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno.
- Mata globosa. Altura: 60 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 4-9.
- Floración en primavera, verano y otoño. Inflorescencias color azules o rosas. Si se eliminan las inflorescencias pasadas, reflorece.
- Hojas medianas, alargadas, verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



20-mayo-2015

## *Viola labradorica* Schrank

Familia: *Violaceae*.

**Origen:** noreste de Estados Unidos, Canadá.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata rastrera, densa. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 2-8.
- Flores pequeñas, color violeta. Floración en primavera.
- Hojas pequeñas acorazonadas, rojizas.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra. **Mantenimiento:** bajo.



19-abril-2019



7-mayo-2015



## ***Viola sororia* Willd.**

Variedad: Freckles

Familia: *Violaceae*

**Origen:** semilla

**Características:**

- Vivaz, la parte aérea no permanece en invierno. Se autosiembra con facilidad.
- Mata rastrera. Altura: 10 cm.
- Zonas climáticas: 3-8.
- Flores pequeñas, blancas con punteaduras azuladas, en primavera.
- Hojas medianas, acorazonadas verde claro.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol-media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



18-abril-2019



9-julio-2015

## ***Verbascum olympicum* Boiss.**

Familia: *Scrophulariaceae*

**Origen:** Grecia y Turquía.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** finales-2016.

**Características:**

- Vivaz o bianual, permanece en invierno. Soporta bien los fuertes calores. Se autosiembra.
- Roseta basal.  
Altura: 180 cm. con flor.
- Zonas climáticas: 5-9.
- Hojas grandes, alargadas, tomentosas, blanquecinas. Muy ornamentales.
- Inflorescencias terminales, con flores amarillas a finales de la primavera. Espectaculares, pero de corta duración.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol.

**Mantenimiento:** medio.



25-abril-2018



5-junio-2018



2-junio-2017



3-agosto-2017



3-octubre-2017

## ***Uncinia rubra* Colenso ex Boot**

Variedad: Fire Dance

Familia: *Cyperaceae*

**Origen:** Nueva Zelanda.

**Cultivo:** semilla.

**Plantación:** 3-mayo-2018.

**Características:**

- Vivaz, permanece en invierno.
- Mata erizada. Altura: 15 cm.
- Zonas climáticas: 6-10.
- Hojas medianas, alargadas, rojizas. Muy ornamentales.
- Floración sin interés.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** pleno sol- media sombra.

**Mantenimiento:** bajo.



15-mayo-2018

18-junio-2018

20-julio-2018

3-agosto-2018

7-septiembre-2018

1-octubre-2018

## ***Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.**

Familia: *Araceae*

**Origen:** Sudáfrica.

**Cultivo:** semilla.

**Características:**

- Vivaz, semipermanente en invierno. Soporta relativamente bien los fuertes calores. Acuática. Suelos húmedos.
- Mata con hojas basales. Altura: 100cm. con flor.
- Zonas climáticas: 7-10.
- Hojas lanceoladas, grandes, verde claro, con largo peciolo.
- Inflorescencia grande con espádice amarillo y espata blanca. Frutos anaranjados.

**Plagas/enfermedades:** no se han observado.

**Orientación:** media sombra.

**Mantenimiento:** medio.



20-julio-2019